


រៀបរៀងដោយ លីម ផល្គុន

Prepared by : LIM PHALKUN



104

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រច្រើនបំផុត

សម្រាប់ថ្នាក់ទី

១១

សិស្សពូកែ និង អាហារូបករណ៍

Problem and Solution

រៀបរៀងដោយ លីម ផល្គុន

104

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រច្រើនរយ

សម្រាប់ថ្នាក់ទី

១១

កេរ្តិ៍សិទ្ធិ ដោយ លឹម ផល្គុន

Tel: 017 768 246

www.mathtoday.wordpress.com

គណៈកម្មការនីត្ត និង រៀបរៀង

លីម ផល្គុន និង សែន ពិសិដ្ឋ

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស

**លោក យ៉ង់ ធារី
លោក លីម សុន
លោក អ៊ុន សំណាង**

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ

លោក លីម មិគ្គសិរ

ការិយកម្មវិធី

លោកស្រី លី គុណ្ណាកា លោក អ៊ុន សំណាង

អេម្បកថា

សួស្តីមិត្តអ្នកសិក្សាជាទីស្រឡាញ់រាប់អាន !

សៀវភៅ ១០៤ លំហាត់អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើសដែលលោកអ្នក
កំពុងតែកាន់អាននេះខ្ញុំបាទបានរៀបចំឡើងរួមមាន ១០៤ លំហាត់
យើងខ្ញុំបានជ្រើសរើសលំហាត់ពិសេសៗមកធ្វើដំណោះស្រាយ តាមរបៀប
ផ្សេងៗពីគ្នាយ៉ាងក្សោះក្សាយ ដែលអាចឲ្យអ្នកសិក្សាងាយយល់ និង ឆាប់
ចងចាំ ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា សៀវភៅមួយក្បាលនេះ នឹងអាចចូលរួមផ្តល់នូវ
គំនិត និង វិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ
ចំពោះលោកអ្នកសិក្សាជាពុំខានឡើយ ។

ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរចំពោះលោកអ្នក សូមមានសុខភាពល្អ
មានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃ និង ទទួលបានជោគជ័យក្នុងគ្រប់ភារកិច្ច ។

បាត់ដំបងថ្ងៃទី១២តុលា ឆ្នាំ2011

អ្នកនិពន្ធ និង ស្រាវជ្រាវ

លឹម ផល្គុន និង សែន ពិសិដ្ឋ

Tel : 017 768 246

Email: lim_phalkun@gmail.com

Website: www.mathtoday.wordpress.com

១០៤ លំហាត់ជ្រើសរើស

១-ដោយដឹងថា $\tan \alpha = \frac{5}{12}$ និង $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ ។

ចូរគណនាតម្លៃនៃ $\cos \alpha$, $\sin \alpha$ និង $\cot \alpha$ ។

២-ចូរគណនា $A = \sqrt{\sin^4 x + 4\cos^2 x} + \sqrt{\cos^4 x + 4\sin^2 x}$

$$B = (a \sin x + b \cos x)^2 + (a \cos x - b \sin x)^2$$

៣-គេដឹងថា $\sin x + \cos x = \frac{41}{29}$ ។

ចូរគណនាផលគុណ $\sin x \cdot \cos x$ រួចទាញរក $\sin x$ និង $\cos x$ ។

៤-គេដឹងថា $\tan x + \cot x = a$ ដែល $0 < x < 90^\circ$ និង $a \geq 2$ ។

ចូរគណនា $\tan^3 x + \cot^3 x$ ជាអនុគមន៍នៃ a ។

៥-ដឹងថា $\cos a = \frac{m}{n+p}$, $\cos b = \frac{n}{p+m}$, $\cos c = \frac{p}{m+n}$

ចូរគណនាកន្សោម ៖

$$M = \frac{\sin^2 a}{2 + 2\cos a - \sin^2 a} + \frac{\sin^2 b}{2 + 2\cos b - \sin^2 b} + \frac{\sin^2 c}{2 + 2\cos c - \sin^2 c}$$

៦-ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់សមភាព ៖

ក. $\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x$

ខ. $\frac{1}{4}(\sin^8 x + \cos^8 x) - \frac{1}{2}(\sin^4 x + \cos^4 x) + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\sin^4 x \cos^4 x$

៧-គេដឹងថា $\tan x = \sqrt{\frac{b}{a}}$, $a > 0, b > 0$ ។

ចូរស្រាយថា $\frac{\cos^4 x}{a} + \frac{\sin^4 x}{b} = \frac{1}{a+b}$

៨-គេដឹងថា $\tan^3 \varphi = \frac{b}{a}$, $a \neq 0, b \neq 0$ ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{\cos^4 \varphi}{\sqrt[3]{a^2}} + \frac{\sin^4 \varphi}{\sqrt[3]{b^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}}$

៩-គេឱ្យ $\frac{\cos^4 x}{a} + \frac{\sin^4 x}{b} = \frac{1}{a+b}$

ដែល $a \neq 0, b \neq 0, a+b \neq 0$ ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{\cos^{10} x}{a^4} + \frac{\sin^{10} x}{b^4} = \frac{1}{(a+b)^4}$ ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

១០-គេឱ្យ $\cos \alpha = \frac{a}{b+c}$, $\cos \beta = \frac{b}{c+a}$, $\cos \gamma = \frac{c}{a+b}$

ចូរស្រាយថា $\tan^2 \frac{\alpha}{2} + \tan^2 \frac{\beta}{2} + \tan^2 \frac{\gamma}{2} = 1$ ។

១១-ចូរបង្ហាញថា $\tan 3a - \tan 2a - \tan a = \tan 3a \tan 2a \tan a$

ដែល $a \neq \frac{k\pi}{2}$ គ្រប់ចំនួនគត់វិទ្យាទីហូ k ។

១២-គេឱ្យ $a ; b ; c ; d$ និង x ជាចំនួនពិតផ្ទៀងផ្ទាត់៖

$$\frac{\sin x}{a} = \frac{\sin 2x}{b} = \frac{\sin 3x}{c} = \frac{\sin 4x}{d} \quad \text{ដែល } x \neq k\pi ; k \in \mathbb{Z}$$

ចូរបង្ហាញថា $a^3(4b^2 - d^2) = b^4(3a - c)$

១៣-គេឱ្យ $f_k(x) = \frac{1}{k} (\sin x + c n^k)$ ដែល $k = 1 ; 2 ; 3 ; \dots$

ចូរបង្ហាញថា $f_4(x) - f_6(x) = \frac{1}{1}$ ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

១៤-គេឱ្យ a, b, c, d ជាចំនួននៅក្នុងចន្លោះ $[0; \pi]$ ដោយដឹងថា

$$\begin{cases} a + 7b = 4(c + 2d) \\ c + 7d = 4(a + 2b) \end{cases}$$

ចូរបង្ហាញថា $2c + a + d = 7c + (b + c)$ ។

១៥-ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $|a \cos x + b \sin x| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$

១៦-ចូរបង្ហាញថា៖

$$\left(\frac{a + b}{2} \right)^2 \geq \frac{a^2 + b^2}{2}$$

១៧-ចូរបង្ហាញថា $\left(1 + \frac{a}{\sin x}\right) \left(1 + \frac{b}{\cos x}\right) \geq \left(1 + \sqrt{2ab}\right)^2$

ចំពោះគ្រប់ $a > 0, b > 0, 0 < x < \frac{\pi}{2}$ ។

១៨-គេឱ្យ x, y, z ជាចំនួនពិតដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ៖

$$\cos x + \cos y + \cos z = 0 \quad \text{និង} \quad \cos 3x + \cos 3y + \cos 3z = 0$$

ចូរបង្ហាញថា $\cos 2x \cos 2y \cos 2z \leq 0$ ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

១៩-ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$\frac{\sin^4 x}{a} + \frac{\cos^4 x}{b} \geq \frac{1}{a+b} \quad ; (a > 0, b > 0)$$

២០-គេឲ្យអនុគមន៍

$$f(x) = \sqrt{a \sin^2 x + b \cos^2 x + c} + \sqrt{a \cos^2 x + b \sin^2 x + c}$$

ដែល a, b, c ជាបីចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។

ចូរស្រាយថា $\sqrt{a+c} + \sqrt{b+c} \leq f(x) \leq 2\sqrt{\frac{a+b}{2} + c}$

រួចបញ្ជាក់តម្លៃអតិបរមា និង អប្បបរមានៃ $f(x)$ ។

២១-គេមានអនុគមន៍

$$f(x) = \sqrt{\left(\sin^2 x + \frac{1}{\sin^2 x}\right)^2 + \left(\cos^2 x + \frac{1}{\cos^2 x}\right)^2}$$

ចូររកតម្លៃតូចបំផុតនៃអនុគមន៍នេះ ។

២២-គេឲ្យ x ជាចំនួនពិតដែល $60x^2 - 71x + 21 < 0$ ។

ចូរបង្ហាញថា $\sin\left(\frac{\pi}{3x-1}\right) < 0$ ។

២៣-គេឲ្យ θ ជាចំនួនពិតដែល $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ។

ចូរបង្ហាញថា $(\sin \theta)^{\cos \theta} + (\cos \theta)^{\sin \theta} > 1$

២៤-ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x \in (0, \frac{\pi}{4})$

ចូរបង្ហាញថា $(\cos x)^{\cos x} > (\sin x)^{\sin x}$

២៥-គេមានអនុគមន៍ f ដែលចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbf{IR}$

គេមាន $f(x) + 2f(-x) = 3\cos x - \sin x$ ។

ចូរស្រាយថា $f(x) \leq \sqrt{2}$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbf{IR}$

២៦-គេឲ្យអនុគមន៍ \div

$f(x;y) = (a \cos x + b \cos y)^2 + (a \sin x + b \sin y)^2$, $a > 0$, $b > 0$

ចំពោះគ្រប់ $x; y \in \mathbf{IR}$ បង្ហាញថា $f(x;y) \leq (a+b)^2$ ។

២៧-ក. ចូរគណនាតម្លៃប្រាកដនៃ $\sin \frac{\pi}{10}$ និង $\cos \frac{\pi}{10}$

ខ. ចូរស្រាយថា $x^2 + (x - y)^2 \leq 4(x^2 + y^2) \sin^2 \frac{\pi}{10}$

គ្រប់ចំនួន $x, y \in \mathbb{R}$ ។

២៨-គេឱ្យអនុគមន៍

$$f(x) = 4(\tan^2 x + \cot^2 x) - 12(\tan x + \cot x) + 9$$

ដែល $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ ។ ចូររកតម្លៃតូចបំផុតនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

២៩-ចូរគណនា $S = \cos^3 \frac{\pi}{9} - \cos^3 \frac{4\pi}{9} + \cos^3 \frac{7\pi}{9}$

៣០-គេឱ្យ $0 < a < \frac{\pi}{2}$ និង $0 < b < \frac{\pi}{2}$ ។

ចូរបង្ហាញថា $\left(\frac{\sin^2 a}{\sin b}\right)^2 + \left(\frac{\cos^2 a}{\cos b}\right)^2 = 1$ លុះត្រាតែ $a = b$ ។

៣១-គណនា $P = \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$

៣២-បង្ហាញថា៖

$$\left(\frac{1}{2} + \cos \frac{\pi}{20}\right)\left(\frac{1}{2} + \cos \frac{3\pi}{20}\right)\left(\frac{1}{2} + \cos \frac{9\pi}{20}\right)\left(\frac{1}{2} + \cos \frac{27\pi}{20}\right) = \frac{1}{16}$$

៣៣-ចូរបង្ហាញថា

$$\cos \frac{\pi}{11} + \cos \frac{3\pi}{11} + \cos \frac{5\pi}{11} + \cos \frac{7\pi}{11} + \cos \frac{9\pi}{11} = \frac{1}{2}$$

៣៤-គណនាតម្លៃនៃផលគុណ

$$P = (1 - \cot 1^\circ)(1 - \cot 2^\circ)(1 - \cot 3^\circ) \dots (1 - \cot 44^\circ)$$

៣៥-ចូរគណនាតម្លៃផលគុណ៖

$$P = (\sqrt{3} + \tan 1^\circ)(\sqrt{3} + \tan 2^\circ) \dots (\sqrt{3} + \tan 29^\circ)$$

៣៦-ចូរគណនា $S = \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{2\pi}{7} + \sin^2 \frac{4\pi}{7}$

៣៧-ចូរគណនា $S = \sin \frac{2\pi}{7} + \sin \frac{4\pi}{7} + \sin \frac{8\pi}{7}$

៣៨-ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$8 \cos^3 \frac{n\pi}{7} + 4(-1)^n \cos^2 \frac{n\pi}{7} - 4 \cos \frac{n\pi}{7} + (-1)^{n+1} = 0, \quad \forall n \in \mathbb{IN}$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

៣៩-គេឲ្យកន្សោម

$$S = \cos^3 \frac{\pi}{7} + \cos^3 \frac{3\pi}{7} + \cos^3 \frac{5\pi}{7} \quad \text{និង} \quad T = \cos^4 \frac{\pi}{7} + \cos^4 \frac{3\pi}{7} + \cos^4 \frac{5\pi}{7}$$

ក. ចូរស្រាយថាបីចំនួន $\cos \frac{\pi}{7}$, $\cos \frac{3\pi}{7}$, $\cos \frac{5\pi}{7}$ ជាឫសរបស់សមីការ

$$(E) : 8x^3 - 4x^2 - 4x + 1 = 0 \quad \text{។}$$

ខ. ទាញរកតម្លៃ ៖

$$M = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}$$

$$N = \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7} + \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7}$$

$$\text{និង} \quad P = \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7} \quad \text{។}$$

គ. គណនា $Q = \cos^2 \frac{\pi}{7} + \cos^2 \frac{3\pi}{7} + \cos^2 \frac{5\pi}{7}$ រួចរកតម្លៃ S និង T ។

៤០-ចូរបង្ហាញថា៖

$$\cos^7 x + \cos^7 \left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos^7 \left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = \frac{63}{64} \cos 3x$$

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

៤១-គេដឹងថា $\frac{\cos x + \cos y + \cos z}{\cos(x + y + z)} = \frac{\sin x + \sin y + \sin z}{\sin(x + y + z)} = a$

ចូរស្រាយថា $\cos(x + y) + \cos(y + z) + \cos(z + x) = a$

៤២-ចូរកំនត់គ្រប់តម្លៃ x ក្នុងចន្លោះ $]0; \frac{\pi}{2}[$ ដោយដឹងថា ៖

$$\frac{\sqrt{3}-1}{\sin x} + \frac{\sqrt{3}+1}{\cos x} = 4\sqrt{2}$$

៤៣-ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$64x^6 - 112x^4 + 56x^2 - 7 = 2\sqrt{1-x^2} \quad \forall$$

៤៤-ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$\tan^6 x + (\tan^2 x + 1)^3 + (\tan^2 x + 2)^3 = (\tan^2 x + 3)^3$$

៤៥-ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$4\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(x + \frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$$

៤៦-១. ចូរស្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត ៖

$$\cos(n+1)x = 2\cos x \cos(nx) - \cos(n-1)x \quad , x \in \mathbb{R} , n \in \mathbb{N}$$

២. អនុវត្តន៍ ៖ ចូរសរសេរ $\cos 7x$ ជាអនុគមន៍នៃ $\cos x$ ។

៣. ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$128\cos^7 x - 244\cos^5 x + 112\cos^3 x - 14\cos x - 1 = 0 \quad ។$$

៤៧-ក. ចូរគណនាតម្លៃប្រាកដនៃ $\tan \frac{\pi}{8}$

ខ. ដោះស្រាយសមីការ

$$\sin^2 x - \sqrt{2} \sin x \cdot \cos x + (\sqrt{2} - 1) \cos^2 x = 0$$

គ. ចូរដោះស្រាយសមីការ $\frac{\tan x + \sqrt{2} - 1}{1 - (\sqrt{2} - 1) \tan x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

៤៨-ក. ចូរគណនាតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\cos \frac{7\pi}{12}$

ខ. ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ ៖

$$\begin{cases} \cos^3 x + 3 \cos x \cos^2 y = \frac{\sqrt{2} + 3\sqrt{6}}{8} \\ 3 \cos^2 x \cos y + \cos^3 y = \frac{\sqrt{2} - 3\sqrt{6}}{8} \end{cases}$$

៤៩-ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x$

ខ. ចូរដោះស្រាយសមីការ $(\sin^3 x + \cos^3 x)^2 = \frac{13}{16} + \frac{1}{4} \sin^3 2x$

៥០-មានសមីការដឺក្រេទីពីរ ៖

(E) : $x^2 + \left(\frac{1}{\cos \phi} - 2\right)x + \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 = 0$ ដែល $0 \leq \phi < \frac{\pi}{2}$

គេឧបមាថាសមីការ (E) មានឫសពីរតាងដោយ $\tan a$ និង $\tan b$

ក. កំនត់តម្លៃ ϕ ដើម្បីឲ្យ $a + b = \frac{\pi}{4}$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ (E) ចំពោះតម្លៃ ϕ ដែលបានរកឃើញ

គ. ប្រើលទ្ធផលខាងលើចូរទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\tan \frac{\pi}{12}$ ។

៥១-គេឲ្យខ្សែកោង

$$(P) : y = f(x) = x^2 \sin \phi - 2(1 + \sin \phi)x + 5 - \sin \phi$$

ដែល $0 < \phi < \pi$ ។

កំនត់តម្លៃ ϕ ដើម្បីឲ្យខ្សែកោង(P) ស្ថិតនៅលើអក្សរអាប៉ូស៊ីសជានិច្ច

៥២-គេឲ្យសមីការដឺក្រេទីពីរ (E) : $x^2 - (m^2 - m)x - m + 2 = 0$

គេសន្មតថាសមីការនេះមានឫសពីរតាងរៀងគ្នាដោយ $\tan a$

និង $\tan b$ ។

ក. ចូរកំនត់តម្លៃនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m ដើម្បីឲ្យ $a + b = \frac{\pi}{3}$ ។

ខ. ចូរដោះស្រាយសមីការខាងលើចំពោះ m ដែលបានរកឃើញ ។

គ. ដោយប្រើលទ្ធផលខាងលើចូរទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\tan \frac{\pi}{12}$ ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

៥៣-គេឲ្យសមីការ (E) : $x^3 - (2m + 3)x^2 + 5x - 3m + 2 = 0$

ឧបមាថាសមីការនេះមានឫបីតាងដោយ $\tan \alpha$, $\tan \beta$, $\tan \gamma$ ។

ក.ចូរគណនា $A = \frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)}{\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$ ជាអនុគមន៍នៃ m ។

ខ.កំនត់ m ដើម្បីឲ្យ $A = 4$ ។

គ.ដោះស្រាយសមីការ (E) ចំពោះតម្លៃ m ដែលបានរកឃើញខាងលើ

៥៤-គេឲ្យសមីការ (E) : $\cos^3 x \cos 3x + \sin^3 x \sin 3x = m$

ក.ចូរដោះស្រាយសមីការនេះកាលណា $m = \frac{3\sqrt{3}}{8}$

ខ.រកលក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ m ដើម្បីឲ្យសមីការនេះមានឫស ។

៥៥-ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$\log_{\sqrt{2}}^2(\sin x) + \log_{\sqrt{2}}(2\sin^3 x) = 0$$

៥៦-គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (U_n) កំណត់លើ \mathbb{IN} ដោយ ៖

$$U_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ និង } U_{n+1} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - U_n^2}}{2}}, \forall n \in \mathbb{IN}$$

គណនា U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

៥៧-គេឲ្យ $a_0 = \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}$ និង $a_{n+1} = \frac{a_n^2 - 5}{2(a_n + 2)}$

ចំពោះគ្រប់ $n \geq 0$ ។

ចូរស្រាយថា $a_n = \cot\left(\frac{2^{n-3}\pi}{3}\right) - 2$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{IN}$ ។

៥៨-គេឲ្យ

$$\sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{2^2}, \sqrt{2 + \sqrt{2}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^3}, \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^4}$$

ពីឧទាហរណ៍ខាងលើចូររករូបមន្តទូទៅ និង ស្រាយបញ្ជាក់

រូបមន្តនោះផង ។

៥៩-គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (U_n) កំនត់ដោយ $U_n = \sqrt{2}^n \cdot \sin \frac{n\pi}{4}$

ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។

ក-ចូរបង្ហាញថា $\sqrt{2} \cdot \cos \frac{(n+1)\pi}{4} = \cos \frac{n\pi}{4} - \sin \frac{n\pi}{4}$

ខ-ទាញឲ្យបានថា $U_n = (\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4} - (\sqrt{2})^{n+1} \cos \frac{(n+1)\pi}{4}$

គ-គណនាផលបូក ៖

$S_n = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n$ ជាអនុគមន៍នៃ n ។

៦០-គេមានអនុគមន៍លេខ f កំនត់ពីសំណុំ \mathbb{N} ទៅសំណុំ \mathbb{R}

$f(0) = 0$ និង $f(n+1) = 2f(n) + \tan \frac{\pi}{2^{n+2}}$ ចូរកំនត់រក $f(n)$ ។

៦១-គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (U_n) កំនត់លើ n ដោយ៖

$U_0 = 1$ និង $\forall n \in \mathbb{N} : U_{n+1} = U_n \cos a + \sin a$

ដែល $0 < a < \frac{\pi}{2}$ ។

ក.តាង $V_n = U_n - \cot \frac{a}{2}$ ។ បង្ហាញថា (V_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ។

ខ.គណនាលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} (V_0 + V_1 + \dots + V_n)$ និង $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ ។

៦២-គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនកុំផ្លិច (Z_n) កំណត់ដោយ ៖

$$\begin{cases} Z_0 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} \\ Z_{n+1} = \frac{1}{2}(Z_n + |Z_n|); n \in \mathbb{N} \end{cases} \quad (|Z_n| \text{ ជាម៉ូឌុលនៃ } Z_n)$$

សន្មតថា $Z_n = \rho_n(\cos \theta_n + i \sin \theta_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$

ដែល $\rho_n > 0$, $\rho_n; \theta_n \in \mathbb{R}$ ។

ក-ចូររកទំនាក់ទំនងរវាង θ_n និង θ_{n+1} ហើយ ρ_n និង ρ_{n+1} ។

ខ-រកប្រភេទនៃស្វ៊ីត (θ_n) រួចគណនា θ_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

គ-ចូរបង្ហាញថា $\rho_n = \rho_0 \cos \theta_0 \cos \frac{\theta_1}{2} \cos \frac{\theta_2}{2} \dots \cos \frac{\theta_{n-1}}{2}$

រួចបញ្ជាក់ ρ_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

៦៣-គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (U_n) កំណត់លើ $\mathbb{N} \cup \{0\}$ ដោយ ៖

$$\begin{cases} U_0 = \sqrt{2} \\ U_{n+1} = \sqrt{2 + U_n} \quad , n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

ក. ចូរគណនា U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

ខ. គណនាផលគុណ $P_n = U_0 \times U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$ ។

៦៤-គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (U_n) កំណត់ដោយ ៖

$$U_0 = 0 \quad ; \quad U_1 = 1 \quad \text{និង} \quad \forall n \in \mathbb{N} : U_{n+2} = 2U_{n+1} \cos a - U_n$$

ដែល $a \in \mathbb{R}$ ។

ក. តាង $Z_n = U_{n+1} - (\cos a - i \sin a) U_n$, $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ។

ចូរបង្ហាញថា $Z_{n+1} = (\cos a + i \sin a) Z_n$ រួចទាញរក Z_n ជាអនុគមន៍នៃ n និង a ។

ខ. ទាញរក U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

៦៥-គណនាផលបូកខាងក្រោម

$$S_n = \frac{t}{c} \frac{a^{\frac{\pi}{8}}}{\frac{\pi}{4}} + \frac{t}{c} \frac{a^{\frac{\pi}{16}}}{\frac{\pi}{8}} + \frac{nt}{6} \frac{a^{\frac{\pi}{24}}}{\frac{\pi}{12}} + \dots + \frac{t}{c} \frac{a^{\frac{\pi}{2^{n+2}}}}{\frac{\pi}{2^{n+1}}}$$

រួចទាញរកលីមីតនៃ S_n កាលណា $n \rightarrow +\infty$ ។

៦៦-គេឲ្យ (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តមួយមានផលសង្ស័យ d ។

$$\text{គេតាង } S_n = \frac{\cos a_1}{\cos d} + \frac{\cos a_2}{\cos^2 d} + \frac{\cos a_3}{\cos^3 d} + \dots + \frac{\cos a_n}{\cos^n d}$$

ចំពោះ $n = 1, 2, 3, \dots$ ។

$$\text{ចូរស្រាយថា } S_n = \frac{\sin a_n}{\cos^n d \sin d} - \frac{\sin a_1}{\sin d}$$

៦៧-ក. ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{2 + \sin(2n-1)x} - \frac{1}{2 + \sin(2n+1)x} = \frac{2 \sin x \cos(2nx)}{[2 + \sin(2n-1)x][2 + \sin(2n+1)x]}$$

$$\text{ខ. គណនា } S_n = \sum_{k=1}^n \left[\frac{\cos(2kx)}{(2 + \sin(2k-1)x)(2 + \sin(2k+1)x)} \right] \quad \text{។}$$

៦៨-ក. ចូរស្រាយថា

$$\cos(2nx) = \frac{1}{2\sin x} [\sin(2n+1)x - \sin(2n-1)x]$$

ខ. គណនាផលបូក

$$S_n = \cos 2x + \cos 4x + \cos 6x + \dots + \cos(2nx)$$

គ. ទាញរកផលបូក

$$T_n = \cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x + \dots + \cos^2(nx)$$

ឃ. គណនាផលបូក

$$U_n = \sin^2 x + \sin^2 2x + \sin^2 3x + \dots + \sin^2(nx)$$

៦៩-ក. ចូរស្រាយថា $\frac{\tan^3 x}{1 - \tan^2 x} = \frac{1}{2} \tan 2x - \tan x$

ខ. ចូរគណនាផលបូក
$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{2^k \tan^3 \frac{a}{2^k}}{1 - \tan^2 \frac{a}{2^k}} \right)$$

៧០-ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនង $\tan x = \cot x - 2 \cot 2x$

ខ. ចូរគណនាផលបូកខាងក្រោម ៖

$$S_n = \tan a + \frac{1}{2} \tan \frac{a}{2} + \frac{1}{2^2} \tan \frac{a}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} \tan \frac{a}{2^n}$$

៧១-គណនាផលគុណខាងក្រោម៖

$$P_n = \prod_{k=0}^n \left(\tan^{2^k} \frac{x}{2^k} \right) = \tan x \cdot \tan^2 \frac{x}{2} \cdot \tan^4 \frac{x}{4} \dots \tan^{2^n} \frac{x}{2^n}$$

៧២-គណនាផលគុណខាងក្រោម៖

$$P_n = \prod_{k=0}^n \left[\left(1 - \tan^2 \frac{x}{2^k} \right)^{2^k} \right]$$

៧៣-គណនាផលគុណ៖

$$P_n = \prod_{k=1}^n \left[\frac{1 + \tan^2 2^k x}{\left(1 - \tan^2 2^k \right)^2} \right] \quad \text{ដែល } |x| < \frac{\pi}{2^{n+2}}$$

៧៤-ក. ចូរស្រាយថា $\frac{1}{\sin 2x} = \cot x - \cot 2x$

ខ. ចូរគណនា $S_n = \frac{1}{\sin a} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^2}} + \dots + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^n}}$

៧៥-ក. ចូរស្រាយថា $1 + \frac{1}{\cos x} = \frac{\cot \frac{x}{2}}{\cot x}$

ខ. គណនា $P_n = (1 + \frac{1}{\cos a})(1 + \frac{1}{\cos \frac{a}{2}})(1 + \frac{1}{\cos \frac{a}{2^2}}) \dots (1 + \frac{1}{\cos \frac{a}{2^n}})$

៧៦-ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\tan 2x \cdot \tan^2 x = \tan 2x - 2 \tan x$

ខ. ចូរគណនាផលបូក $S_n = \sum_{k=0}^n \left[2^k \tan \frac{a}{2^k} \tan^2 \frac{a}{2^{k+1}} \right]$

៧៧-ក. ចូរស្រាយថា $\sin^3 x = \frac{1}{4} (3 \sin x - \sin 3x)$

ខ. ចូរគណនា

$$S_n = \sin^3 \frac{a}{3} + 3 \sin^3 \frac{a}{3^2} + 3^2 \sin^3 \frac{a}{3^3} + \dots + 3^{n-1} \sin^3 \frac{a}{3^n}$$

៧៨-ក. ចូរស្រាយថា $\frac{1}{\cos^2 x} = \frac{4}{\sin^2 2x} - \frac{1}{\sin^2 x}$

ខ. ចូរគណនា $S_n = \frac{1}{4\cos^2 \frac{a}{2}} + \frac{1}{4^2 \cos^2 \frac{a}{2^2}} + \dots + \frac{1}{4^n \cos^2 \frac{a}{2^n}}$

៧៩-ក. ចូរស្រាយថា $\frac{1}{\sin 2x} = \cot x - \cot 2x$

ខ. ចូរគណនា $S_n = \frac{1}{\sin a} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^2}} + \dots + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^n}}$

៨០-ក. ចូរស្រាយថា $\frac{\sin(nx)}{\cos^n x} = \left[\frac{\cos(n+1)x}{\cos^{n+1} x} - \frac{\cos(nx)}{\cos^n x} \right] \cdot \cot x$

ខ. ចូរគណនា $S_n = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin 2x}{\cos^2 x} + \frac{\sin 3x}{\cos^3 x} + \dots + \frac{\sin(nx)}{\cos^n x}$

៨១-ក. ចូរបង្ហាញថា $1 + \tan x \tan(nx) = \frac{\cos(n-1)x}{\cos x \cos(nx)}$

ខ. គណនា $P_n = \prod_{k=1}^n [1 + \tan x \tan(kx)] \quad \sphericalangle$

៨២-ក. ចូរស្រាយថា

$$\frac{1}{\cos(nx) \cdot \cos(n+1)x} = \frac{1}{\sin x} [\tan(n+1)x - \tan(nx)]$$

ខ. គណនាផលបូក $S_n = \sum_{p=1}^n \left[\frac{1}{\cos(px) \cos(p+1)x} \right]$

៨៣-ក. ចូរស្រាយថា

$$\tan(n+1)x - \tan(nx) = \tan x [1 + \tan(nx) \tan(n+1)x]$$

ខ. គណនាផលបូក

$$S_n = \tan x \tan 2x + \tan 2x \tan 3x + \dots + \tan(nx) \tan(n+1)x$$

៨៤-ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $2 \cos x - 1 = \frac{1 + 2 \cos 2x}{1 + 2 \cos x}$

ខ. ចូរគណនាផលគុណ ៖

$$P_n = (2 \cos a - 1)(2 \cos \frac{a}{2} - 1)(2 \cos \frac{a}{2^2} - 1) \dots (2 \cos \frac{a}{2^n} - 1)$$

៨៥-ក. ចូរស្រាយថា $\frac{\tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x} = \frac{1}{8} (\tan 3x - 3 \tan x)$

ខ. ចូរគណនាផលបូក $S_n = \sum_{k=0}^n \left[\frac{3^k \tan^3 \frac{a}{3^k}}{1 - 3 \tan^2 \frac{a}{3^k}} \right]$

៨៦-គេឱ្យត្រីកោណ ABC មានជ្រុង a, b, c និងមានមុំក្នុង α, β, γ ។ បើ $\alpha = 3\beta$ ចូរបង្ហាញថា $(a-b)(a^2 - b^2) = bc^2$

៨៧-គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយមាន a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងឈម រៀងគ្នានៃមុំ A, B, C ។

តាង p ជាកន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ។

ក. ចូរស្រាយថា $\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}}$ រួចទាញរកទំនាក់ទំនង

ពីរទៀតដែលស្រដៀងគ្នានេះ ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $bc \cdot \cos^2 \frac{A}{2} + ac \cdot \cos^2 \frac{B}{2} + ab \cdot \cos^2 \frac{C}{2} = p^2$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

៨៨-គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយមានមុំក្នុងជាមុំស្រួច ។

ក. ចូរស្រាយថា $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$ ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$ ។

៨៩-គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយមានមុំក្នុងជាមុំស្រួច ។

ចូរស្រាយថា $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C < 1$

៩០-គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយមានមុំក្នុងជាមុំស្រួច ។

ចូរស្រាយថា $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C > 2$ ។

៩១-គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយ ។

ក. ចូរស្រាយថា $\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$ ។

ខ. ចូរស្រាយថា $\cot^2 A - 1 = 2 \cot 2A \cot A$ ។

គ. គេដឹងថាមុំ $A ; B ; C$ បង្កើតបានជាស្វីតធរណីមាត្រ

មួយដែលមានអសុដ្ឋស្មើនឹង $q = 2$ ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{1}{\sin^2 A} + \frac{1}{\sin^2 B} + \frac{1}{\sin^2 C} = 8$ ។

៩២-រកតម្លៃអប្បបរមានៃអនុគមន៍ ៖

$$P(x) = \tan^2 x + \cot^2 x - 2(\tan x + \cot x) + 27$$

$$Q(x) = \tan^2 x + \cot^2 x - 8(\tan x + \cot x) + 87$$

ដែល $0 < x < \frac{\pi}{2}$ ។

៩៣-គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយ។

បង្ហាញថាបើ $\tan \frac{A}{3}$, $\tan \frac{B}{3}$, $\tan \frac{C}{3}$ ជាឫសរបស់សមីការ

$$(E) : x^3 + ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{នោះគេបាន } \sqrt{3} + a = \sqrt{3}b + c \quad \text{។}$$

៩៤-គេឲ្យត្រីកោណ ABC ដែល $\sin \frac{A}{2} = \frac{a}{2\sqrt{bc}}$ ។

រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ?

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

៩៥-មានត្រីកោណ ABC មួយដែល $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ ។

តាង R និង S រៀងគ្នាជាកាំ និង ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC នេះ ។

ចូរស្រាយថា
$$\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c} = \frac{R(\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C)}{4S}$$

៩៦-ក្នុងគ្រប់ត្រីកោណ ABC ចូរស្រាយថា ៖

ក/
$$(1 + \cos A)(1 + \cos B)(1 + \cos C) = \frac{(\sin A + \sin B + \sin C)^2}{2}$$

ខ/
$$\left(1 + \frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3}\right)^3 \geq \left(\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{\sqrt{2}}\right)^2$$

៩៧-គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយ ។

ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $1 - \cos A \leq \frac{a^2}{2bc}$

ដែល a, b, c ជាជ្រុងត្រីកោណ ABC ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $(1 - \cos A)(1 - \cos B)(1 - \cos C) \leq \frac{1}{8}$

៩៨-គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយ ។

ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C - 2\sin B \sin C \cos A$

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា ៖

$$\cot A + \cot B + \cot C = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C}{2\sin A \sin B \sin C}$$

៩៩-គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយមានមុំ A, B, C ជាមុំស្រួចដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព

$$\cot A + \cot B + \cot C = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\sin C} \right) \quad ។$$

ចូរស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណសមង្វី ?

១០០-តាង R ជាកាំរង្វង់ចារឹកក្នុង និង S ជាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC មួយ

ក. ចូរស្រាយថា $(\cot A + \cot B)(\cot B + \cot C)(\cot C + \cot A) = \frac{2R^2}{S}$

ខ. បើ ABC ជាមុំស្រួចនោះចូរទាញឱ្យបានថា $\cos A \cos B \cos C \leq \frac{1}{8}$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

១០១-ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ គេឱ្យ $S_n = c \cos \frac{n\pi}{12} + s \sin \frac{n\pi}{12}$

ក. គណនាតម្លៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\sin \frac{\pi}{12}$

ខ. បង្ហាញថា $4S_{n+2} - 2\sqrt{6}S_{n+1} + S_n = 0$

១០២-គេឱ្យត្រីកោណ ABC ហើយគេតាង r និង R រៀងគ្នាជាកាំរង្វង់ចារឹកក្នុង និង កាំរង្វង់ចារឹកក្រៅនៃត្រីកោណ ។

ចូរស្រាយថា $c \cot A + c \cot B + c \cot C = 1 + \frac{r}{R}$

១០៣-គេយក A, B, C ជាមុំបីនៃត្រីកោណ ABC ។

តាងអនុគមន៍ $y = \cot A + \frac{2\sin A}{\cos A + \cos(B - C)}$

រកតម្លៃអប្បបរមានៃអនុគមន៍នេះ ?

១០៤-គេឱ្យ ABC ជាត្រីកោណមួយហើយតាង r និង R

រៀងគ្នាជាកាំរង្វង់ចារឹកក្នុង និងកាំរង្វង់ចារឹកក្រៅ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា ៖

$$\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} + \sin \frac{C}{2} \sin \frac{A}{2} \leq \frac{5}{8} + \frac{r}{4R} \text{ ។}$$

លំហាត់ទី១

ដោយដឹងថា $\tan \alpha = \frac{5}{12}$ និង $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ ។

ចូរគណនាតម្លៃនៃ $\cos \alpha$, $\sin \alpha$ និង $\cot \alpha$ ។

ដំណោះស្រាយ

គណនាតម្លៃនៃ $\cos \alpha$, $\sin \alpha$ និង $\cot \alpha$

គេមាន $\tan \alpha = \frac{5}{12}$ និង $0^\circ < \alpha < 90^\circ$

តាមទំនាក់ទំនង $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$

គេទាញ $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{1 + \left(\frac{5}{12}\right)^2} = \frac{144}{169}$

ដោយ $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ នោះ $\cos \alpha > 0$

ដូចនេះ $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ហើយតាមទំនាក់ទំនង $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

តែទាញ $\sin \alpha = \tan \alpha \cos \alpha = \frac{5}{12} \cdot \frac{12}{13} = \frac{5}{13}$

រួច $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{12}{5}$ ។

ដូចនេះ $\cos \alpha = \frac{12}{13}$; $\sin \alpha = \frac{5}{13}$; $\cot \alpha = \frac{12}{5}$ ។

លំហាត់ទី២

ចូរគណនា $A = \sqrt{\sin^4 x + 4\cos^2 x} + \sqrt{\cos^4 x + 4\sin^2 x}$

$$B = (a \sin x + b \cos x)^2 + (a \cos x - b \sin x)^2$$

ដំណោះស្រាយ

គណនា A និង B

$$A = \sqrt{\sin^4 x + 4\cos^2 x} + \sqrt{\cos^4 x + 4\sin^2 x}$$

ដោយ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ នៅ៖ $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

ឬ $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

គេបាន $A = \sqrt{\sin^4 x + 4(1 - \sin^2 x)} + \sqrt{\cos^4 x + 4(1 - \cos^2 x)}$

$$= \sqrt{\sin^4 x - 4\sin^2 x + 4} + \sqrt{\cos^4 x - 4\cos^2 x + 4}$$

$$= \sqrt{(\sin^2 x - 2)^2} + \sqrt{(\cos^2 x - 2)^2}$$

$$= |\sin^2 x - 2| + |\cos^2 x - 2|$$

ដោយ $0 \leq \sin^2 x \leq 1$ និង $0 \leq \cos^2 x \leq 1$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$\text{គេប៉ាន } A = -(\sin^2 x - 2) - (\cos^2 x - 2)$$

$$= 4 - (\sin^2 x + \cos^2 x) = 4 - 1 = 3 \quad \text{។}$$

$$B = (a \sin x + b \cos x)^2 + (a \cos x - b \sin x)^2$$

$$= a^2(\sin^2 x + \cos^2 x) + b^2(\sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$= a^2 + b^2$$

$$\text{ដូច្នេះ: } A = 3, B = a^2 + b^2 \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៣

គេដឹងថា $\sin x + \cos x = \frac{41}{29}$ ។

ចូរគណនាផលគុណ $\sin x \cdot \cos x$ រួចទាញរក $\sin x$ និង $\cos x$ ។

ដំណោះស្រាយ

គណនាផលគុណ $\sin x \cdot \cos x$

គេមាន $(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x$

ដោយ $\sin x + \cos x = \frac{41}{29}$ និង $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

គេបាន $\left(\frac{41}{29}\right)^2 = 1 + 2\sin x \cos x$ ឬ $2\sin x \cos x = \frac{41^2 - 29^2}{29^2} = \frac{840}{841}$

ដូចនេះ $\sin x \cdot \cos x = \frac{420}{841}$ ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ទាញរក $\sin x$ និង $\cos x$:

$$\text{ដោយគេមាន } \sin x + \cos x = \frac{41}{29}$$

$$\text{និង } \sin x \cdot \cos x = \frac{420}{841} \text{ នោះតាមទ្រឹស្តីបទផ្សេងៗ } \sin x \text{ និង } \cos x$$

$$\text{ជាបួសសមីការ } X^2 - \frac{41}{29}X + \frac{420}{841} = 0 \text{ ។}$$

$$\text{បន្ទាប់ពីដោះស្រាយសមីការនេះគេបាន } X_1 = \frac{20}{29} ; X_2 = \frac{21}{29}$$

$$\text{ដូចនេះ } \sin x = \frac{20}{29} ; \cos x = \frac{21}{29} \text{ ឬ } \sin x = \frac{21}{29} ; \cos x = \frac{20}{29} \text{ ។}$$

លំហាត់ទី៤

គេដឹងថា $\tan x + \cot x = a$ ដែល $0 < x < 90^\circ$ និង $a \geq 2$ ។

ចូរគណនា $\tan^3 x + \cot^3 x$ ជាអនុគមន៍នៃ a ។

ដំណោះស្រាយ

គណនា $\tan^3 x + \cot^3 x$ ជាអនុគមន៍នៃ a

គេមាន $\tan x + \cot x = a$

គេបាន $(\tan x + \cot x)^2 = a^2$

$$\tan^2 x + 2 \tan x \cot x + \cot^2 x = a^2 \quad \text{ដោយ } \tan x \cot x = 1$$

គេទាញ $\tan^2 x + \cot^2 x = a^2 - 2$

តាមសមភាព $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - A.B + B^2)$

គេបាន $\tan^3 x + \cot^3 x = (\tan x + \cot x)(\tan^2 x - \tan x \cot x + \cot^2 x)$

$$= a(a^2 - 2 - 1) = a(a^2 - 3)$$

ដូច្នេះ $\tan^3 x + \cot^3 x = a^3 - 3a$ ។

លំហាត់ទី៥

គេដឹងថា $\cos a = \frac{m}{n+p}$, $\cos b = \frac{n}{p+m}$, $\cos c = \frac{p}{m+n}$

ចូរគណនាកន្សោម ៖

$$M = \frac{\sin^2 a}{2 + 2\cos a - \sin^2 a} + \frac{\sin^2 b}{2 + 2\cos b - \sin^2 b} + \frac{\sin^2 c}{2 + 2\cos c - \sin^2 c}$$

ដំណោះស្រាយ

$$M = \frac{\sin^2 a}{2 + 2\cos a - \sin^2 a} + \frac{\sin^2 b}{2 + 2\cos b - \sin^2 b} + \frac{\sin^2 c}{2 + 2\cos c - \sin^2 c}$$

គេមាន $\sin^2 a = 1 - \cos^2 a = (1 - \cos a)(1 + \cos a)$

នឹង $2 + 2\cos a - \sin^2 a = 1 + 2\cos a + \cos^2 a = (1 + \cos a)^2$

គេបាន $\frac{\sin^2 a}{2 + 2\cos a - \sin^2 a} = \frac{(1 - \cos a)(1 + \cos a)}{(1 + \cos a)^2} = \frac{1 - \cos a}{1 + \cos a}$

ហើយ $\frac{\sin^2 b}{2 + 2\cos b - \sin^2 b} = \frac{1 - \cos b}{1 + \cos b}$

នឹង $\frac{\sin^2 c}{2 + 2\cos c - \sin^2 c} = \frac{1 - \cos c}{1 + \cos c}$

គេបាន $E = \frac{1 - \cos a}{1 + \cos a} + \frac{1 - \cos b}{1 + \cos b} + \frac{1 - \cos c}{1 + \cos c}$

$$= \frac{1 - \frac{m}{n+p}}{1 + \frac{m}{n+p}} + \frac{1 - \frac{n}{p+m}}{1 + \frac{n}{p+m}} + \frac{1 - \frac{p}{m+n}}{1 + \frac{p}{m+n}}$$
$$= \frac{n+p-m+p+m-n+m+n-p}{m+n+p} = 1$$

ដូចនេះ $E = 1$ ។

លំហាត់ទី៦

ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ចូរស្រាយបញ្ជាក់សមភាព ៖

ក. $\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x$

ខ. $\frac{1}{4}(\sin^8 x + \cos^8 x) - \frac{1}{2}(\sin^4 x + \cos^4 x) + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\sin^4 x \cos^4 x$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយបញ្ជាក់សមភាព ៖

ក. $\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x$

គេមាន $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

ឬ $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$

យក $a = \sin^2 x$ និង $b = \cos^2 x$ គេបាន ៖

$$\sin^6 x + \cos^6 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^3 - 3\sin^2 x \cos^2 x(\sin^2 x + \cos^2 x)$$

ដោយ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

ដូច្នេះ $\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x$ ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$ខ. \frac{1}{4}(\sin^8 x + \cos^8 x) - \frac{1}{2}(\sin^4 x + \cos^4 x) + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\sin^4 x \cos^4 x$$

គេមាន $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ឬ $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$

ដូចគ្នាដែរ $a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2a^2b^2$

ឬ $a^4 + b^4 = [(a+b)^2 - 2ab]^2 - 2a^2b^2$

ដោយយក $a = \sin^2 x$ និង $b = \cos^2 x$ គេបានសមភាព

$$\begin{aligned}\sin^4 x + \cos^4 x &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x \\ &= 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x\end{aligned}$$

ហើយគេមាន ៖

$$\begin{aligned}\sin^8 x + \cos^8 x &= [(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x]^2 - 2\sin^4 x \cos^4 x \\ &= (1 - 2\sin^2 x \cos^2 x)^2 - 2\sin^4 x \cos^4 x \\ &= 1 - 4\sin^2 x \cos^2 x + 2\sin^4 x \cos^4 x\end{aligned}$$

តាំងអនុគមន៍

$$f(x) = \frac{1}{4}(\sin^8 x + \cos^8 x) - \frac{1}{2}(\sin^4 x + \cos^4 x) + \frac{1}{4}$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4}(1 - 4\sin^2 x \cos^2 x + 2\sin^4 x \cos^4 x) - \frac{1}{2}(1 - 2\sin^2 x \cos^2 x) + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1 - 4\sin^2 x \cos^2 x + 2\sin^4 x \cos^4 x - 2 + 4\sin^2 x \cos^2 x + 1}{4} \\ &= \frac{2\sin^4 x \cos^4 x}{4} = \frac{1}{2}\sin^4 x \cos^4 x \end{aligned}$$

ដូច្នេះ: $\frac{1}{4}(\sin^8 x + \cos^8 x) - \frac{1}{2}(\sin^4 x + \cos^4 x) + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\sin^4 x \cos^4 x$ ។

លំហាត់ទី៧

គេដឹងថា $\tan x = \sqrt{\frac{b}{a}}$, $a > 0, b > 0$ ។

ចូរស្រាយថា $\frac{\cos^4 x}{a} + \frac{\sin^4 x}{b} = \frac{1}{a+b}$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយថា $\frac{\cos^4 x}{a} + \frac{\sin^4 x}{b} = \frac{1}{a+b}$

គេមាន $\tan x = \sqrt{\frac{b}{a}}$ នាំឱ្យ $\tan^2 x = \frac{b}{a}$ ដោយ $\tan x = \frac{\cos x}{\sin x}$

គេបាន $\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{b}{a}$ ឬ $\frac{\cos^2 x}{a} = \frac{\sin^2 x}{b} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{a+b} = \frac{1}{a+b}$

គេទាញ $\frac{\cos^2 x}{a} = \frac{1}{a+b}$ នាំឱ្យ $\frac{\cos^4 x}{a} = \frac{a}{(a+b)^2}$ (1)

ហើយ $\frac{\sin^2 x}{b} = \frac{1}{a+b}$ នាំឱ្យ $\frac{\sin^4 x}{b} = \frac{b}{(a+b)^2}$ (2)

បូកសមភាព (1) និង (2) អង្កុំ និង អង្កុំគេបាន៖

$$\frac{\cos^4 x}{a} + \frac{\sin^4 x}{b} = \frac{a}{(a+b)^2} + \frac{b}{(a+b)^2} = \frac{a+b}{(a+b)^2} = \frac{1}{a+b} \quad \text{ពិត។}$$

លំហាត់ទី៨

គេដឹងថា $\tan^3 \varphi = \frac{b}{a}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$ ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{\cos^4 \varphi}{\sqrt[3]{a^2}} + \frac{\sin^4 \varphi}{\sqrt[3]{b^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}}$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{\cos^4 \varphi}{\sqrt[3]{a^2}} + \frac{\sin^4 \varphi}{\sqrt[3]{b^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}}$

គេមាន $\tan^3 \varphi = \frac{b}{a}$ នាំឱ្យ $\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \sqrt[3]{\frac{b}{a}}$

គេទាញ $\frac{\cos \varphi}{\sqrt[3]{a}} = \frac{\sin \varphi}{\sqrt[3]{b}}$

ឬ $\frac{\cos^2 \varphi}{\sqrt[3]{a^2}} = \frac{\sin^2 \varphi}{\sqrt[3]{b^2}} = \frac{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}}$

គេទាញ $\frac{\cos^2 \varphi}{\sqrt[3]{a^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}}$ និង $\frac{\sin^2 \varphi}{\sqrt[3]{b^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}}$

គេទាញ
$$\frac{\cos^4 \varphi}{\sqrt[3]{a^2}} = \frac{\sqrt[3]{a^2}}{(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2})^2}$$

និង
$$\frac{\sin^4 \varphi}{\sqrt[3]{b^2}} = \frac{\sqrt[3]{b^2}}{(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2})^2}$$

បូកសមីការពីនេះគេទទួលបាន ៖

$$\frac{\cos^4 \varphi}{\sqrt[3]{a^2}} + \frac{\sin^4 \varphi}{\sqrt[3]{b^2}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}}{(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2})^2} = \frac{1}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}} \quad \text{ពិត}$$

ដូច្នេះ
$$\frac{\cos^4 \varphi}{\sqrt[3]{a^2}} + \frac{\sin^4 \varphi}{\sqrt[3]{b^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៩

គេឱ្យ $\frac{\cos^4 x}{a} + \frac{\sin^4 x}{b} = \frac{1}{a+b}$

ដែល $a \neq 0$, $b \neq 0$, $a + b \neq 0$ ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{\cos^{10} x}{a^4} + \frac{\sin^{10} x}{b^4} = \frac{1}{(a+b)^4}$ ។

ដំណោះស្រាយ

យើងមាន $\frac{\cos^4 x}{a} + \frac{\sin^4 x}{b} = \frac{1}{a+b}$

យើងបាន $(a+b)(b \cos^4 x + a \sin^4 x) = ab$

$$ab \cos^4 x + a^2 \sin^4 x + b^2 \cos^4 x + ab \sin^4 x - ab = 0$$

$$a^2 \sin^4 x + b^2 \cos^4 x + ab (\sin^4 x + \cos^4 x - 1) = 0$$

$$a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^4 x - 2ab \sin^2 x \cos^2 x = 0$$

$$(a \sin^2 x - b \cos^2 x) = 0$$

គេទាញ $\frac{\cos^2 x}{a} = \frac{\sin^2 x}{b} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{a + b} = \frac{1}{a + b}$

គេបាន $\frac{\cos^2 x}{a} = \frac{1}{a + b}$ នាំឱ្យ $\frac{\cos^{10} x}{a^4} = \frac{a}{(a + b)^5}$ (1)

ហើយ $\frac{\sin^2 x}{b} = \frac{1}{a + b}$ នាំឱ្យ $\frac{\sin^{10} x}{b^4} = \frac{a}{(a + b)^5}$ (2)

បូកសមីការ (1) និង (2) គេបាន

$$\frac{\cos^{10} x}{a^4} + \frac{\sin^{10} x}{b^4} = \frac{a + b}{(a + b)^5} = \frac{1}{(a + b)^4}$$

ដូច្នេះ: $\frac{\cos^{10} x}{a^4} + \frac{\sin^{10} x}{b^4} = \frac{1}{(a + b)^4}$ ។

លំហាត់ទី១០

គេឱ្យ $\cos \alpha = \frac{a}{b+c}$, $\cos \beta = \frac{b}{c+a}$, $\cos \gamma = \frac{c}{a+b}$

ចូរស្រាយថា $\tan^2 \frac{\alpha}{2} + \tan^2 \frac{\beta}{2} + \tan^2 \frac{\gamma}{2} = 1$ ។

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយថា $\tan^2 \frac{\alpha}{2} + \tan^2 \frac{\beta}{2} + \tan^2 \frac{\gamma}{2} = 1$

យើងមាន $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos \alpha}{2}$, $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1+\cos \alpha}{2}$

គេបាន $\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos \alpha}{1+\cos \alpha} = \frac{1-\frac{a}{b+c}}{1+\frac{a}{b+c}} = \frac{b+c-a}{b+c+a}$

$$\tan^2 \frac{\beta}{2} = \frac{1-\cos \beta}{1+\cos \beta} = \frac{1-\frac{b}{c+a}}{1+\frac{b}{c+a}} = \frac{c+a-b}{c+a+b}$$

$$\tan^2 \frac{\gamma}{2} = \frac{1-\cos \gamma}{1+\cos \gamma} = \frac{1-\frac{c}{a+b}}{1+\frac{c}{a+b}} = \frac{a+b-c}{a+b+c}$$

យើងបាន ៖

$$\tan^2 \frac{\alpha}{2} + \tan^2 \frac{\beta}{2} + \tan^2 \frac{\gamma}{2} = \frac{b+c-a}{a+b+c} + \frac{c+a-b}{a+b+c} + \frac{a+b-c}{a+b+c}$$

$$\tan^2 \frac{\alpha}{2} + \tan^2 \frac{\beta}{2} + \tan^2 \frac{\gamma}{2} = \frac{b+c-a+c+a-b+a+b-c}{a+b+c}$$

$$\tan^2 \frac{\alpha}{2} + \tan^2 \frac{\beta}{2} + \tan^2 \frac{\gamma}{2} = \frac{a+b+c}{a+b+c} = 1 \quad \text{ពិត}$$

ដូច្នេះនេះ $\tan^2 \frac{\alpha}{2} + \tan^2 \frac{\beta}{2} + \tan^2 \frac{\gamma}{2} = 1$ ។

លំហាត់ទី១១

ចូរបង្ហាញថា $\tan 3a - \tan 2a - \tan a = \tan 3a \tan 2a \tan a$

ដែល $a \neq \frac{k\pi}{2}$ គ្រប់ចំនួនគត់វិទ្យាទីហ្វ k ។

ដំណោះស្រាយ

បង្ហាញថា $\tan 3a - \tan 2a - \tan a = \tan 3a \tan 2a \tan a$

គេមាន $\tan 3a = \tan(2a + a)$

$$\tan 3a = \frac{\tan 2a + \tan a}{1 - \tan 2a \tan a}$$

$$\tan 3a(1 - \tan 2a \tan a) = \tan 2a + \tan a$$

$$\tan 3a - \tan 3a \tan 2a \tan a = \tan 2a + \tan a$$

ដូច្នេះ $\tan 3a - \tan 2a - \tan a = \tan 3a \tan 2a \tan a$ ។

លំហាត់ទី១២

គេឱ្យ $a ; b ; c ; d$ និង x ជាចំនួនពិតផ្ទៀងផ្ទាត់៖

$$\frac{\sin x}{a} = \frac{\sin 2x}{b} = \frac{\sin 3x}{c} = \frac{\sin 4x}{d} \quad \text{ដែល } x \neq k\pi ; k \in \mathbb{Z}$$

ចូរបង្ហាញថា $a^3(4b^2 - d^2) = b^4(3a - c)$

ដំណោះស្រាយ

តាង $\frac{\sin x}{a} = \frac{\sin 2x}{b} = \frac{\sin 3x}{c} = \frac{\sin 4x}{d} = t$

$$\text{គេទាញ} \begin{cases} \sin x = at \\ \sin 2x = bt \\ \sin 3x = ct \\ \sin 4x = dt \end{cases}$$

គេមាន $\sin 4x = 2 \sin 2x \cos 2x$

$$\sin^2 4x = 4 \sin^2 2x \cos^2 2x$$

$$\sin^2 4x = 4 \sin^2 2x (1 - \sin^2 2x)$$

$$d^2 t^2 = 4b^2 t^2 (1 - b^2 t^2)$$

$$\text{គេទាញ } t^2 = \frac{1}{b^2} \left(1 - \frac{d^2}{4b^2} \right) \quad (1)$$

$$\text{ម៉្យាងទៀត } \sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\sin 3x = \sin x(3 - 4 \sin^2 x)$$

$$ct = at(3 - 4a^2t^2)$$

$$\text{គេទាញ } t^2 = \frac{1}{4a^2} \left(3 - \frac{c}{a} \right) \quad (2)$$

ជំរុំ (1) និង (2) គេបាន៖

$$\frac{1}{b^2} \left(1 - \frac{d^2}{4b^2} \right) = \frac{1}{4a^2} \left(3 - \frac{c}{a} \right)$$

$$\frac{4b^2 - d^2}{4b^4} = \frac{3a - c}{4a^3}$$

$$\text{គុណអង្គទាំងពីរនឹង } a^3b^4 \text{ គេបាន } a^3(4b^2 - d^2) = b^4(3a - c)$$

$$\text{ដូចនេះ } a^3(4b^2 - d^2) = b^4(3a - c) \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី១៣

គេឱ្យ $f_k(x) = \frac{1}{k} (x + c)^k$ ដែល $k = 1; 2; 3; \dots$

ចូរបង្ហាញថា $f_4(x) - f_6(x) = \frac{1}{12}$ ។

ដំណោះស្រាយ

បង្ហាញថា $f_4(x) - f_6(x) = \frac{1}{12}$

$$\begin{aligned} \text{គេមាន } f_4(x) &= \frac{1}{4} (x + c)^4 \\ &= \frac{1}{4} [(x^2 + cx)^2 - 2x^2cx] \\ &= \frac{1}{4} (1 - 2x^2cx) \end{aligned}$$

ហើយ $f_6(x) = \frac{1}{6} (x + c)^6$

$$\begin{aligned} f_6(x) &= \frac{1}{6} [(x^2 + cx)^3 + 3x^2cx(x + c)^2] \\ &= \frac{1}{6} (1 - 3x^2cx) \end{aligned}$$

គេបាន $f_4(x) - f_6(x) = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$

ដូចនេះ $f_4(x) - f_6(x) = \frac{1}{12}$ ។

លំហាត់ទី១៤

គេឱ្យ a, b, c, d ជាចំនួននៅក្នុងចន្លោះ $[0; \pi]$ ដោយដឹងថា

$$\begin{cases} a + 7b = 4c + 2d \\ a + 7c = 4b + 2d \end{cases}$$

ចូរបង្ហាញថា $2c + a + d = 7c + (b + c)$ ។

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $\begin{cases} a + 7b = 4c + 2d \\ a + 7c = 4b + 2d \end{cases}$

ឬ $\begin{cases} a - 8b = 4c - 2d \\ a + 7c = 4b + 2d \end{cases}$

ឬ $\begin{cases} (a - 8b - 4c + 2d)^2 = (4b + 2d - a)^2 & (ii) \\ (a + 7c - 4b - 2d)^2 = (4c + 2d - a)^2 & (i) \end{cases}$

បូកសមីការ (i) និង (ii) អង្គនឹងអង្គគេបាន ៖

$$\begin{aligned} 6(a - 8b - 4c + 2d) &= 6(4b + 2d - a) \\ -12c + 12d &= -6a + 24b + 12d - 6a \end{aligned}$$

ដូចនេះ $2c + a + d = 7c + (b + c)$ ។

លំហាត់ទី១៥

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $|a \cos x + b \sin x| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយបញ្ជាក់ថា $|a \cos x + b \sin x| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$

ឧបមាថា $|a \cos x + b \sin x| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$ ពិត

សមមូល $(a \cos x + b \sin x)^2 \leq a^2 + b^2$

ដោយ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ នោះគេបាន ៖

$$(a \cos x + b \sin x)^2 \leq (a^2 + b^2)(\sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$a^2 \cos^2 x + 2ab \sin x \cos x + b^2 \sin^2 x \leq a^2 \sin^2 x + a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x$$

$$\text{ឬ } a^2 \sin^2 x - 2ab \sin x \cos x + b^2 \cos^2 x \geq 0$$

$$\text{ឬ } (a \sin x - b \cos x)^2 \geq 0 \text{ ពិត}$$

$$\text{ដូច្នេះ } |a \cos x + b \sin x| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \text{ ពិត ។}$$

លំហាត់ទី១៦

ចូរបង្ហាញថា៖

$$(\sin x + a \cos x)(\sin x + b \cos x) \leq 1 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $(\sin x + a \cos x)(\sin x + b \cos x) \leq 1 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ (1)

-បើ $\cos x = 0$ នោះ $\sin^2 x \leq 1 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ ពិត

-បើ $\cos x \neq 0$ យើងចែកអង្គទាំងពីរនៃ (1) នឹង $\cos^2 x$

$$(\tan x + a)(\tan x + b) \leq \left[1 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2\right] \frac{1}{\cos^2 x}$$

តាង $t = \tan x$ នោះ $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x = 1 + t^2$

$$\text{គេបាន } (t+a)(t+b) = \left[1 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2\right] (1+t^2)$$

$$t^2 + (a+b)t + ab \leq 1 + t^2 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 t^2$$

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 t^2 - (a+b)t + 1 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - ab \geq 0$$

$$\left(\frac{a+b}{2}t - 1\right)^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 \geq 0 \text{ ពិត}$$

ដូច្នេះ: $(\sin x + a \cos x)(\sin x + b \cos x) \leq 1 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ ។

លំហាត់ទី១៧

ចូរបង្ហាញថា $\left(1 + \frac{a}{\sin x}\right) \left(1 + \frac{b}{\cos x}\right) \geq \left(1 + \sqrt{2ab}\right)^2$

ចំពោះគ្រប់ $a > 0, b > 0, 0 < x < \frac{\pi}{2}$ ។

ដំណោះស្រាយ

បង្ហាញថា $\left(1 + \frac{a}{\sin x}\right) \left(1 + \frac{b}{\cos x}\right) \geq \left(1 + \sqrt{2ab}\right)^2$

គេមាន $\left(1 + \frac{a}{\sin x}\right) \left(1 + \frac{b}{\cos x}\right) = 1 + \frac{a}{\sin x} + \frac{b}{\cos x} + \frac{ab}{\sin x \cos x}$

តាមវិសមភាព AM – GM គេមាន ៖

$$\frac{a}{\sin x} + \frac{b}{\cos x} \geq \frac{2\sqrt{ab}}{\sqrt{\sin x \cos x}} \text{ នោះគេបាន ៖}$$

$$\left(1 + \frac{a}{\sin x}\right) \left(1 + \frac{b}{\cos x}\right) \geq 1 + \frac{2\sqrt{ab}}{\sqrt{\sin x \cos x}} + \frac{ab}{\sin x \cos x}$$

$$\left(1 + \frac{a}{\sin x}\right)\left(1 + \frac{b}{\cos x}\right) \geq \left(1 + \sqrt{\frac{ab}{\sin x \cos x}}\right)^2$$

$$\left(1 + \frac{a}{\sin x}\right)\left(1 + \frac{b}{\cos x}\right) \geq \left(1 + \frac{\sqrt{2ab}}{\sqrt{\sin 2x}}\right)^2 \geq \left(1 + \sqrt{2ab}\right)^2$$

ពីព្រោះគ្រប់ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ គេមាន $\sin 2x \leq 1$ ។

$$\text{ដូចនេះ: } \left(1 + \frac{a}{\sin x}\right)\left(1 + \frac{b}{\cos x}\right) \geq \left(1 + \sqrt{2ab}\right)^2 \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី១៨

គេឲ្យ x, y, z ជាចំនួនពិតដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ ៖

$$\cos x + \cos y + \cos z = 0 \quad \text{និង} \quad \cos 3x + \cos 3y + \cos 3z = 0$$

ចូរបង្ហាញថា $\cos 2x \cos 2y \cos 2z \leq 0$ ។

ដំណោះស្រាយ

បង្ហាញថា $\cos 2x \cos 2y \cos 2z \leq 0$

តាមរូបមន្ត $\cos 3a = 4\cos^3 a - 3\cos a$

គេទាញ $4\cos^3 x = 3\cos x + \cos 3x$ (1)

$$4\cos^3 y = 3\cos y + \cos 3y \quad (2)$$

$$4\cos^3 z = 3\cos z + \cos 3z \quad (3)$$

បូកទំនាក់ទំនង (1), (2), (3) គេបាន ៖

$$4\cos^3 x + 4\cos^3 y + 4\cos^3 z = 0$$

ឬ $\cos^3 x + \cos^3 y + \cos^3 z = 0$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

(ជ្រើសរើស: $\cos x + \cos y + \cos z = 0$ និង $\cos 3x + \cos 3y + \cos 3z = 0$)

គេមាន $\cos x + \cos y + \cos z = 0$

គេបាន $\cos x + \cos y = -\cos z$ លើកជាគូបគេបាន ៖

$$(\cos x + \cos y)^3 = -\cos^3 z$$

$$\cos^3 x + 3\cos x \cos y (\cos x + \cos y) + \cos^3 y = -\cos^3 z$$

$$\cos^3 x - 3\cos x \cos y \cos z + \cos^3 y = -\cos^3 z$$

$$\cos^3 x + \cos^3 y + \cos^3 z = 3\cos x \cos y \cos z$$

ដោយ $\cos^3 x + \cos^3 y + \cos^3 z = 0$ គេទាញ $3\cos x \cos y \cos z = 0$

នាំឱ្យ $\cos x = 0$ ឬ $\cos y = 0$ ឬ $\cos z = 0$ ។

ដោយសន្មតយក $\cos x = 0$ នៅ: $\cos y = -\cos z$

គេបាន ៖

$$\cos 2x \cos 2y \cos 2z = (2\cos^2 x - 1)(2\cos^2 y - 1)(2\cos^2 z - 1)$$

$$\cos 2x \cos 2y \cos 2z = -(2\cos^2 z - 1)^2 \leq 0$$

ដូចនេះបញ្ហាត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់ ។

លំហាត់ទី១៩

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$\frac{\sin^4 x}{a} + \frac{\cos^4 x}{b} \geq \frac{1}{a+b} \quad ; (a > 0, b > 0)$$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{\sin^4 x}{a} + \frac{\cos^4 x}{b} \geq \frac{1}{a+b}$

តាមវិសមភាព Cauchy – Schwarz គេបាន៖

$$\frac{\sin^4 x}{a} + \frac{\cos^4 x}{b} = \frac{(\sin^2 x)^2}{a} + \frac{(\cos^2 x)^2}{b}$$

$$\frac{\sin^4 x}{a} + \frac{\cos^4 x}{b} \geq \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2}{a+b}$$

ដោយ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

ដូច្នេះ $\frac{\sin^4 x}{a} + \frac{\cos^4 x}{b} \geq \frac{1}{a+b}$ ។

លំហាត់ទី២០

គេឲ្យអនុគមន៍

$$f(x) = \sqrt{a \sin^2 x + b \cos^2 x + c} + \sqrt{a \cos^2 x + b \sin^2 x + c}$$

ដែល a, b, c ជាបីចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។

ចូរស្រាយថា $\sqrt{a+c} + \sqrt{b+c} \leq f(x) \leq 2 \sqrt{\frac{a+b}{2} + c}$

រួចបញ្ជាក់តម្លៃអតិបរមា និង អប្បបរមានៃ $f(x)$ ។

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយថា $\sqrt{a+c} + \sqrt{b+c} \leq f(x) \leq 2 \sqrt{\frac{a+b}{2} + c}$

យើងមាន ៖

$$f(x) = \sqrt{a \sin^2 x + b \cos^2 x + c} + \sqrt{a \cos^2 x + b \sin^2 x + c} \quad (1)$$

ដោយ a, b, c ជាបីចំនួនពិតវិជ្ជមាននោះ $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) > 0$

លើកអង្គទាំងពីរនៃ (1) ជាការេគេបាន ៖

$$f^2(x) = \left(\sqrt{a \sin^2 x + b \cos^2 x + c} + \sqrt{a \cos^2 x + b \sin^2 x + c} \right)^2$$

$$f^2(x) = a + b + 2c + 2\sqrt{(a \sin^2 x + b \cos^2 x + c)(a \cos^2 x + b \sin^2 x + c)} \quad (2)$$

តាមវិសមភាពកូស៊ីគ្រប់ចំនួនពិត $A, B \geq 0$

គេមាន $A + B \geq 2\sqrt{A \cdot B}$ ឬ $2\sqrt{A \cdot B} \leq A + B$

គេបាន ៖

$$2\sqrt{(a \sin^2 x + b \cos^2 x + c)(a \cos^2 x + b \sin^2 x + c)} \leq a + b + 2c$$

តាមទំនាក់ទំនង (2) គេទាញបាន ៖

$$f^2(x) \leq a + b + 2c + a + b + 2c = 4\left(\frac{a+b}{2} + c\right)$$

នាំឲ្យ $f(x) \leq 2\sqrt{\frac{a+b}{2} + c} \quad (3)$

ម្យ៉ាងទៀតយើងតាង ៖

$$P(x) = (a \sin^2 x + b \cos^2 x + c)(a \cos^2 x + b \sin^2 x + c)$$

$$P(x) = [a(1 - \cos^2 x) + b \cos^2 x + c][a \cos^2 x + b(1 - \cos^2 x) + c]$$

$$P(x) = [(a + c) + (b - a)\cos^2 x][(b + c) - (b - a)\cos^2 x]$$

$$P(x) = (a + c)(b + c) + (b - a)^2 \cos^2 x - (b - a)^2 \cos^4 x$$

$$P(x) = (a + c)(b + c) + (b - a)^2 \cos^2 x \sin^2 x$$

យើងមាន $(b - a)^2 \sin^2 x \cos^2 x \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

គេទាញបាន $P(x) \geq (a + c)(b + c)$, $\forall x \in \mathbb{R}$

ទំនាក់ទំនង (2) គេអាចសរសេរ ៖

$$f^2(x) = a + b + 2c + 2\sqrt{P(x)} \geq a + b + 2c + 2\sqrt{(a + c)(b + c)}$$

$$f^2(x) \geq (a + c) + (b + c) + 2\sqrt{(a + c)(b + c)}$$

$$f^2(x) \geq (\sqrt{a + c} + \sqrt{b + c})^2$$

គេទាញ $f(x) \geq \sqrt{a + c} + \sqrt{b + c}$ (4)

តាមទំនាក់ទំនង (3) និង (4) គេទាញបាន ៖

$$\sqrt{a + c} + \sqrt{b + c} \leq f(x) \leq 2\sqrt{\frac{a + b}{2} + c} \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } x \in \mathbb{R}$$

លំហាត់ទី២១

គេមានអនុគមន៍ $f(x) = \sqrt{\left(\sin^2 x + \frac{1}{\sin^2 x}\right)^2 + \left(\cos^2 x + \frac{1}{\cos^2 x}\right)^2}$

ចូររកតម្លៃតូចបំផុតនៃអនុគមន៍នេះ ។

ដំណោះស្រាយ

រកតម្លៃតូចបំផុតនៃ $f(x)$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{\left(\cos^2 x + \frac{1}{\cos^2 x}\right)^2 + \left(\sin^2 x + \frac{1}{\sin^2 x}\right)^2} \\ &= \sqrt{\cos^4 x + 2 + \frac{1}{\cos^4 x} + \sin^4 x + 2 + \frac{1}{\sin^4 x}} \\ &= \sqrt{4 + (\cos^4 x + \sin^4 x) + \left(\frac{1}{\sin^4 x} + \frac{1}{\cos^4 x}\right)} \\ &= \sqrt{4 + (\cos^4 x + \sin^4 x)\left(1 + \frac{1}{\sin^4 x \cos^4 x}\right)} \\ &= \sqrt{4 + \left[(\cos^2 x + \sin^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x\right]\left(1 + \frac{16}{\sin^4 2x}\right)} \\ &= \sqrt{4 + \left(1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x\right)\left(1 + \frac{16}{\sin^4 2x}\right)} \end{aligned}$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ដោយគេមាន $\sin^2 2x \leq 1$ នាំឱ្យ $1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x \geq \frac{1}{2}$

និង $1 + \frac{16}{\sin^4 2x} \geq 17$ ។

គេទាញ $4 + (1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x)(1 + \frac{16}{\sin^4 2x}) \geq 4 + \frac{17}{2} = \frac{25}{2}$

យើងបាន ៖

$$f(x) = \sqrt{4 + (1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x)(1 + \frac{16}{\sin^4 2x})} \geq \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

ដូចនេះតម្លៃតូចបំផុតនៃអនុគមន៍គឺ $m = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ ។

លំហាត់ទី២២

គេឲ្យ x ជាចំនួនពិតដែល $60x^2 - 71x + 21 < 0$ ។

ចូរបង្ហាញថា $\sin\left(\frac{\pi}{3x-1}\right) < 0$ ។

ដំណោះស្រាយ

បង្ហាញថា $\sin\left(\frac{\pi}{3x-1}\right) < 0$

តាង $f(x) = 60x^2 - 71x + 21$

បើ $f(x) = 0 \Leftrightarrow 60x^2 - 71x + 21 = 0$

$$\Delta = (-71)^2 - 4(60)(21) = 5041 - 5040 = 1$$

គេទាញយក $x_1 = \frac{71-1}{120} = \frac{7}{12}$, $x_2 = \frac{71+39}{120} = \frac{3}{5}$

យើងបាន $f(x) = 60x^2 - 71x + 21 < 0$

នាំឲ្យ $\frac{7}{12} < x < \frac{3}{5}$ ឬ $\frac{7}{4} < 3x < \frac{9}{5}$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$\text{ឬ } \frac{3}{4} < 3x-1 < \frac{4}{5} \quad \text{នាំឱ្យ } \frac{4}{5} < \frac{1}{3x-1} < \frac{4}{3}$$

$$\text{គេទាញ } \frac{4\pi}{5} < \frac{\pi}{3x-1} < \frac{4\pi}{3} \quad \text{នាំឱ្យ } \sin\left(\frac{\pi}{3x-1}\right) < 0 \quad \text{។}$$

$$\text{ដូចនេះ បើ } x \text{ ជាចំនួនពិតដែល } 60x^2 - 71x + 21 < 0$$

$$\text{នោះគេបាន } \sin\left(\frac{\pi}{3x-1}\right) < 0 \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី២៣

គេឲ្យ θ ជាចំនួនពិតដែល $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ។

ចូរបង្ហាញថា $(\sin \theta)^{\cos \theta} + (\cos \theta)^{\sin \theta} > 1$

ដំណោះស្រាយ

បង្ហាញថា $(\sin \theta)^{\cos \theta} + (\cos \theta)^{\sin \theta} > 1$

តាមវិសមភាព Bernoulli

គេមាន $(1+x)^\alpha \leq 1+\alpha x$, $\forall x > -1$, $\alpha > 0$

យើងមាន ៖

$$\left(\frac{1}{\sin \theta}\right)^{\cos \theta} = \left(1 + \frac{1 - \sin \theta}{\sin \theta}\right)^{\cos \theta}$$

$$\left(\frac{1}{\sin \theta}\right)^{\cos \theta} < 1 + \frac{\cos \theta(1 - \sin \theta)}{\sin \theta}$$

$$\left(\frac{1}{\sin \theta}\right)^{\cos \theta} < \frac{\sin \theta + \cos \theta - \sin \theta \cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\text{ឬ } (\sin \theta)^{\cos \theta} > \frac{\sin \theta}{\sin \theta + \cos \theta - \sin \theta \cos \theta} \quad (1)$$

ស្រាយដូចខាងលើនេះដែរយើងបាន៖

$$(\cos \theta)^{\sin \theta} > \frac{\cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta - \sin \theta \cos \theta} \quad (2)$$

បូកវិសមភាព (1) និង (2) ខាងលើនេះយើងបាន ៖

$$(\sin \theta)^{\cos \theta} + (\cos \theta)^{\sin \theta} > \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta - \sin \theta \cos \theta}$$

$$\text{ដោយគេមាន } \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta - \sin \theta \cos \theta} > 1$$

$$\text{ដូចនេះ } (\sin \theta)^{\cos \theta} + (\cos \theta)^{\sin \theta} > 1 \quad \sphericalcap$$

លំហាត់ទី២៤

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x \in (0, \frac{\pi}{4})$

ចូរបង្ហាញថា $(\cos x)^{\cos x} > (\sin x)^{\sin x}$

ដំណោះស្រាយ

បង្ហាញថា $(\cos x)^{\cos x} > (\sin x)^{\sin x}$

តាមវិសមភាព Bernoulli ចំពោះគ្រប់ចំនួន x និង a

ដែល $x > -1$ និង $a > 1$

យើងមាន $(1+x)^a \geq 1+ax$ ។

ហេតុនេះចំពោះ $0 < x < \frac{\pi}{4}$ គេបាន៖

$$(\cos^2 x)^{\frac{\cos x}{\sin x}} = (1 - \sin x)^{\frac{\cos x}{\sin x}} \cdot (1 + \sin x)^{\frac{\cos x}{\sin x}}$$

ដោយ $(1 - \sin x)^{\frac{\cos x}{\sin x}} > 1 - \cos x$

នឹង $(1 + \sin x)^{\frac{\cos x}{\sin x}} > 1 + \cos x$

គេបាន $(\cos^2 x)^{\frac{\cos x}{\sin x}} > (1 - \cos x)(1 + \cos x) = \sin^2 x$

គេទាញ $(\cos x)^{\frac{\cos x}{\sin x}} > \sin x$

$$\ln(\cos x)^{\frac{\cos x}{\sin x}} > \ln(\sin x)$$

$$\frac{\cos x}{\sin x} \ln(\cos x) > \ln(\sin x)$$

$$\cos x \ln(\cos x) > \sin x \ln(\sin x)$$

$$\ln(\cos x)^{\cos x} > \ln(\sin x)^{\sin x}$$

ដូច្នេះ $(\cos x)^{\cos x} > (\sin x)^{\sin x}$ ។

លំហាត់ទី២៥

គេមានអនុគមន៍ f ដែលចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbf{IR}$

$$\text{គេមាន } f(x) + 2f(-x) = 3\cos x - \sin x \quad \text{។}$$

ចូរស្រាយថា $f(x) \leq \sqrt{2}$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbf{IR}$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយថា $f(x) \leq \sqrt{2}$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbf{IR}$

$$\text{គេមាន } f(x) + 2f(-x) = 3\cos x - \sin x \quad (1)$$

ដោយជំនួស x ដោយ $-x$ ក្នុងទំនាក់ទំនង (1) គេបាន

$$f(-x) + 2f(x) = 3\cos x + \sin x \quad (2)$$

យើងបានប្រព័ន្ធសមីការ ៖

$$\underbrace{\begin{cases} f(x) + 2f(-x) = 3\cos x - \sin x & | & 1 \\ 2f(x) + f(-x) = 3\cos x + \sin x & | & -2 \end{cases}}_{-3f(x)}$$

$$-3f(x) = -3\cos x - 3\sin x$$

គេទាញបាន $f(x) = \cos x + \sin x$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\sin \frac{\pi}{4} \cos x + \sin x \cos \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \sqrt{2} \sin \left(\frac{\pi}{4} + x \right) \end{aligned}$$

ដោយ $\forall x \in \mathbb{R} : \sin \left(\frac{\pi}{4} + x \right) \leq 1$ ។

ដូចនេះ $f(x) \leq \sqrt{2}$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

លំហាត់ទី២៦

គេឲ្យអនុគមន៍ ៖

$$f(x;y) = (a \cos x + b \cos y)^2 + (a \sin x + b \sin y)^2$$

(ដែល $a > 0$, $b > 0$) ។

ចំពោះគ្រប់ $x; y \in \mathbb{R}$ បង្ហាញថា $f(x;y) \leq (a + b)^2$ ។

ដំណោះស្រាយ

$$f(x;y) = (a \cos x + b \cos y)^2 + (a \sin x + b \sin y)^2$$

$$= a^2(\cos^2 x + \sin^2 x) + b^2(\cos^2 y + \sin^2 y) + 2ab(\cos x \cos y + \sin x \sin y)$$

$$= a^2 + b^2 + 2ab \cos(x - y)$$

$$\text{គឺបាន } f(x;y) = a^2 + b^2 + 2ab \cos(x - y)$$

ដោយគេមាន $\forall x;y \in \mathbb{R} : \cos(x - y) \leq 1$

យើងបាន $f(x) \leq a^2 + b^2 + 2ab = (a + b)^2$

ដូចនេះ $f(x;y) \leq (a + b)^2$ ។

លំហាត់ទី២៧

ក. ចូរគណនាតម្លៃប្រាកដនៃ $\sin \frac{\pi}{10}$ និង $\cos \frac{\pi}{10}$

ខ. ចូរស្រាយថា $x^2 + (x - y)^2 \leq 4(x^2 + y^2) \sin^2 \frac{\pi}{10}$

គ្រប់ចំនួន $x, y \in \mathbb{R}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. គណនាតម្លៃប្រាកដនៃ $\sin \frac{\pi}{10}$ និង $\cos \frac{\pi}{10}$

គេមាន $\frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{10}$

គេបាន $\sin \frac{2\pi}{10} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{10}\right) = \cos \frac{3\pi}{10}$

តាមរូបមន្តត្រីកោណមាត្រ ៖

$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$ និង $\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$2\sin\frac{\pi}{10}\cos\frac{\pi}{10} = \cos\frac{3\pi}{10}$$

$$2\sin\frac{\pi}{10}\cos\frac{\pi}{10} = 3\cos\frac{\pi}{10} - 4\cos^3\frac{\pi}{10}$$

$$2\sin\frac{\pi}{10} = 3 - 4\cos^2\frac{\pi}{10}$$

$$2\sin\frac{\pi}{10} = 3 - 4(1 - \sin^2\frac{\pi}{10})$$

ឬ $4\sin^2\frac{\pi}{10} - 2\sin\frac{\pi}{10} - 1 = 0$ តាង $t = \sin\frac{\pi}{10} > 0$

គេបាន $4t^2 - 2t - 1 = 0$, $\Delta' = 1 + 4 = 5 > 0$

គេទាញប្រស $t_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{4} < 0$, $t_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$

ដូចនេះ $\sin\frac{\pi}{10} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$ ។ ដោយ $\sin^2\frac{\pi}{10} + \cos^2\frac{\pi}{10} = 1$

នាំឲ្យ $\cos\frac{\pi}{10} = \sqrt{1 - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{4}$

ដូចនេះ $\cos\frac{\pi}{10} = \frac{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{4}$ ។

ខ. ស្រាយថា $x^2 + (x-y)^2 \leq 4(x^2 + y^2) \sin^2 \frac{\pi}{10}$

តាងអនុគមន៍ $f(x;y) = x^2 + (x-y)^2 - 4(x^2 + y^2) \sin^2 \frac{\pi}{10}$

គេបាន $f(x;y) = x^2 + x^2 - 2xy + y^2 - 4(x^2 + y^2) \left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^2$

$$= 2x^2 - 2xy + y^2 - 4(x^2 + y^2) \frac{6+2\sqrt{5}}{16}$$

$$= 2x^2 - 2xy + y^2 - (x^2 + y^2) \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

$$= \frac{1-\sqrt{5}}{2} x^2 - 2xy - \frac{1+\sqrt{5}}{2} y^2$$

$$= - \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} x^2 + 2xy + \frac{\sqrt{5}+1}{2} y^2 \right)$$

$$= - \left(\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} x + \sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} y \right)^2 \leq 0, \forall x, y \in \mathbb{R}$$

ដូចនេះ: $x^2 + (x-y)^2 \leq 4(x^2 + y^2) \sin^2 \frac{\pi}{10}$ ។

លំហាត់ទី២៨

គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = 4(\tan^2 x + \cot^2 x) - 12(\tan x + \cot x) + 9$

ដែល $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ ។ ចូររកតម្លៃតូចបំផុតនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

ដំណោះស្រាយ

រកតម្លៃតូចបំផុតនៃអនុគមន៍ $f(x)$

គេមាន $f(x) = 4(\tan^2 x + \cot^2 x) - 12(\tan x + \cot x) + 9$

តាំង $t = \tan x + \cot x \geq 2\sqrt{\tan x \cot x} = 2$

គេបាន $t^2 = (\tan x + \cot x)^2 = \tan^2 x + \cot^2 x + 2$

ឬ $\tan^2 x + \cot^2 x = t^2 - 2$

គេបាន $f(x) = 4(t^2 - 2) - 12t + 9 = (2t - 3)^2 - 8$

ដោយ $t \geq 2$ នោះ $2t - 3 \geq 4 - 3 = 1$ គេបាន $f(x) \geq 1 - 8 = -7$

ដូចនេះតម្លៃតូចបំផុតនៃ $f(x)$ ស្មើនឹង -7 ។

លំហាត់ទី២៩

ចូរគណនា $S = \cos^3 \frac{\pi}{9} - \cos^3 \frac{4\pi}{9} + \cos^3 \frac{7\pi}{9}$

ដំណោះស្រាយ

គណនា $S = \cos^3 \frac{\pi}{9} - \cos^3 \frac{4\pi}{9} + \cos^3 \frac{7\pi}{9}$

តាមរូបមន្ត $\cos 3a = 4\cos^3 a - 3\cos a$

ឬ $\cos^3 a = \frac{3}{4}\cos a + \frac{1}{4}\cos 3a$

កន្សោមដែលឲ្យអាចសរសេរជា ៖

$$S = \frac{3}{4}(\cos \frac{\pi}{9} - \cos \frac{4\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9}) + \frac{1}{4}(\cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{4\pi}{3} + \cos \frac{7\pi}{3})$$

តាង $M = \cos \frac{\pi}{9} - \cos \frac{4\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9}$

ដោយ $-\cos \frac{4\pi}{9} = \cos \frac{13\pi}{9}$

$$M = \cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{13\pi}{9}$$

គុណនឹង $2\sin \frac{\pi}{3}$ គេបាន

$$2M \sin \frac{\pi}{3} = 2\cos \frac{\pi}{9} \sin \frac{\pi}{3} + 2\cos \frac{7\pi}{9} \sin \frac{\pi}{3} + 2\cos \frac{13\pi}{9} \sin \frac{\pi}{3}$$

$$2M \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{4\pi}{9} - \sin\left(-\frac{2\pi}{9}\right) + \sin \frac{10\pi}{9} - \sin \frac{4\pi}{9} + \sin \frac{16\pi}{9} - \sin \frac{10\pi}{9}$$

$$2M \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{2\pi}{9} + \sin \frac{16\pi}{9} = 2 \sin \pi \cos\left(-\frac{7\pi}{9}\right) = 0$$

គេទាញបាន $M = 0$

$$\text{តាំង } N = \cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{4\pi}{3} + \cos \frac{7\pi}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{គេបាន } S = \frac{3}{4}M + \frac{1}{4}N = \frac{3}{8} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូចនេះ: } S = \cos^3 \frac{\pi}{9} - \cos^3 \frac{4\pi}{9} + \cos^3 \frac{7\pi}{9} = \frac{3}{8} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៣០

គេឲ្យ $0 < a < \frac{\pi}{2}$ និង $0 < b < \frac{\pi}{2}$ ។

ចូរបង្ហាញថា $\left(\frac{\sin^2 a}{\sin b}\right)^2 + \left(\frac{\cos^2 a}{\cos b}\right)^2 = 1$ លុះត្រាតែ $a = b$ ។

ដំណោះស្រាយ

ការបង្ហាញ

គេមាន $\left(\frac{\sin^2 a}{\sin b}\right)^2 + \left(\frac{\cos^2 a}{\cos b}\right)^2 = 1$

សមមូល $(\sin^2 b + \cos^2 b) \left(\frac{\sin^4 a}{\sin^2 b} + \frac{\cos^4 a}{\cos^2 b}\right) = 1$

$$\sin^4 a + \cos^4 a + \frac{\cos^2 b}{\sin^2 b} \sin^4 a + \frac{\sin^2 b}{\cos^2 b} \cos^4 a = 1$$

$$1 - 2\sin^2 a \cos^2 a + \frac{\cos^2 b}{\sin^2 b} \sin^4 a + \frac{\sin^2 b}{\cos^2 b} \cos^4 a = 1$$

$$\left(\frac{\cos b}{\sin b} \sin^2 a - \frac{\sin b}{\cos b} \cos^2 a \right)^2 = 0$$

គេទាញ $\frac{\cos b}{\sin b} \sin^2 a = \frac{\sin b}{\cos b} \cos^2 a$

សមមូល $\frac{\sin^2 a}{\cos^2 a} = \frac{\sin^2 b}{\cos^2 b}$

សមមូល $\tan^2 a = \tan^2 b$

ដោយ $0 < a < \frac{\pi}{2}$ និង $0 < b < \frac{\pi}{2}$ នោះគេទាញ $a = b$ ។

លំហាត់ទី៣១

គណនា $P = \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$

ដំណោះស្រាយ

គណនា $P = \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$

តាង $z = \cos 20^\circ + i \sin 20^\circ$ ហើយ $z^9 = \cos 180^\circ + i \sin 180^\circ = -1$

គេបាន $\cos 20^\circ = \frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{z + \frac{1}{z}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}$ (ព្រោះ $\bar{z} = \frac{1}{z}$)

$$\cos 40^\circ = \frac{z^2 + \bar{z}^2}{2} = \frac{z^4 + 1}{2z^2} ; \cos 80^\circ = \frac{z^4 + \bar{z}^4}{2} = \frac{z^8 + 1}{2z^4}$$

$$P = \frac{(z^2 + 1)(z^4 + 1)(z^8 + 1)}{8z^7} = \frac{(z^2 - 1)(z^2 + 1)(z^4 + 1)(z^8 + 1)}{8z^7(z^2 - 1)}$$
$$= \frac{z^{16} - 1}{8(z^9 - z^7)} = \frac{-z^7 - 1}{8(-1 - z^7)} = \frac{1}{8}$$

ដូច្នេះ $P = \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{8}$ ។

លំហាត់ទី៣២

បង្ហាញថា៖

$$\left(\frac{1}{2} + \cos \frac{\pi}{20}\right) \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{3\pi}{20}\right) \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{9\pi}{20}\right) \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{27\pi}{20}\right) = \frac{1}{16}$$

ដំណោះស្រាយ

$$\begin{aligned} \text{តាង } P &= \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{\pi}{20}\right) \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{3\pi}{20}\right) \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{9\pi}{20}\right) \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{27\pi}{20}\right) \\ &= \prod_{n=0}^3 \left[\frac{1}{2} + \cos \left(\frac{3^n \pi}{20} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\text{គេមាន } \frac{1}{2} + \cos a = \frac{1}{2} + 1 - 2\sin^2 \frac{a}{2} = \frac{1}{2} (3 - 4\sin^2 \frac{a}{2})$$

$$\text{ហើយ } \sin \frac{3a}{2} = 3\sin \frac{a}{2} - 4\sin^2 \frac{a}{2} = \sin \frac{a}{2} (3 - 4\sin^2 \frac{a}{2})$$

$$\text{នាំឱ្យ } 3 - 4\sin^2 \frac{a}{2} = \frac{\sin \frac{3a}{2}}{\sin \frac{a}{2}}$$

ហេតុនេះ: $\frac{1}{2} + \cos a = \frac{1}{2} \frac{\sin \frac{3a}{2}}{\sin \frac{a}{2}}$

យក $a = \frac{3^n \pi}{20}$ គេបាន $\frac{1}{2} + \cos \left(\frac{3^n \pi}{20} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \frac{3^{n+1} \pi}{40}}{\sin \frac{3^n \pi}{40}}$

គេបាន $P = \prod_{n=0}^3 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \frac{3^{n+1} \pi}{40}}{\sin \frac{3^n \pi}{40}} \right) = \frac{1}{16} \cdot \frac{\sin \frac{81\pi}{40}}{\sin \frac{\pi}{40}} = \frac{1}{16}$

ព្រោះ: $\sin \frac{81\pi}{40} = \sin \left(2\pi + \frac{\pi}{40} \right) = \sin \frac{\pi}{40}$ ។

ដូចនេះ:

$$\left(\frac{1}{2} + \cos \frac{\pi}{20} \right) \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{3\pi}{20} \right) \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{9\pi}{20} \right) \left(\frac{1}{2} + \cos \frac{27\pi}{20} \right) = \frac{1}{16}$$

លំហាត់ទី៣៣

ចូរបង្ហាញថា $\cos \frac{\pi}{11} + \cos \frac{3\pi}{11} + \cos \frac{5\pi}{11} + \cos \frac{7\pi}{11} + \cos \frac{9\pi}{11} = \frac{1}{2}$

ដំណោះស្រាយ

យក $z = \cos \frac{\pi}{11} + i \sin \frac{\pi}{11}$ ហើយ $z^{11} = -1$

គឺមាន $W = z + z^3 + z^5 + z^7 + z^9 = \frac{z^{11} - z}{z^2 - 1} = \frac{-1 - z}{z^2 - 1} = \frac{1}{1 - z}$

ដោយ $1 - z = 1 - \cos \frac{\pi}{11} - i \sin \frac{\pi}{11} = 2 \sin \frac{\pi}{22} (\sin \frac{\pi}{22} - i \cos \frac{\pi}{22})$

$$W = \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{22} (\sin \frac{\pi}{22} - i \cos \frac{\pi}{22})} = \frac{1}{2} + i \frac{1}{2} \cot \frac{\pi}{22}$$

ផ្អែកពិតនៃ W គឺ $\cos \frac{\pi}{11} + \cos \frac{3\pi}{11} + \cos \frac{5\pi}{11} + \cos \frac{7\pi}{11} + \cos \frac{9\pi}{11}$

ដូចនេះ

$$\cos \frac{\pi}{11} + \cos \frac{3\pi}{11} + \cos \frac{5\pi}{11} + \cos \frac{7\pi}{11} + \cos \frac{9\pi}{11} = \frac{1}{2}$$

លំហាត់ទី៣៤

គណនាតម្លៃនៃផលគុណ

$$P = (1 - \cot 1^\circ)(1 - \cot 2^\circ)(1 - \cot 3^\circ) \dots (1 - \cot 44^\circ)$$

ដំណោះស្រាយ

យើងពិនិត្យ $1 - \cot a = 1 - \frac{\cos a}{\sin a} = \frac{\sin a - \cos a}{\sin a}$

ដោយ $\sin a - \cos a = \sqrt{2} \sin(45^\circ - a)$

ហេតុនេះ $1 - \cot a = \sqrt{2} \frac{\sin(45^\circ - a)}{\sin a}$

យើងបាន $P = \prod_{a=1^\circ}^{44^\circ} (1 - \cot a) = \prod_{a=1^\circ}^{44^\circ} \left[\sqrt{2} \frac{\sin(45^\circ - a)}{\sin a} \right]$

$$P = (\sqrt{2})^{44} \cdot \frac{\sin 44^\circ \cdot \sin 43^\circ \dots \sin 1^\circ}{\sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \dots \sin 44^\circ} = 2^{22}$$

ដូច្នេះ $P = (1 - \cot 1^\circ)(1 - \cot 2^\circ) \dots (1 - \cot 44^\circ) = 2^{22}$ ។

លំហាត់ទី៣៥

ចូរគណនាតម្លៃផលគុណ៖

$$P = (\sqrt{3} + \tan 1^\circ)(\sqrt{3} + \tan 2^\circ) \dots (\sqrt{3} + \tan 29^\circ)$$

ដំណោះស្រាយ

គណនាតម្លៃផលគុណ $P = \prod_{k=1}^{29} (\sqrt{3} + \tan k^\circ)$

គេមាន $\sqrt{3} + \tan k^\circ = \sqrt{3} + \frac{\sin k^\circ}{\cos k^\circ} = \frac{\sqrt{3} \cos k^\circ + \sin k^\circ}{\cos k^\circ}$

$$= \frac{2 \cos(30^\circ - k^\circ)}{\cos k^\circ}$$

គេបាន $P = \prod_{k=1}^{29} \left[\frac{2 \cos(30^\circ - k^\circ)}{\cos k^\circ} \right]$

$$= \frac{2^{29} \cos 29^\circ \cos 28^\circ \dots \cos 2^\circ \cos 1^\circ}{\cos 1^\circ \cos 2^\circ \dots \cos 28^\circ \cos 29^\circ} = 2^{29}$$

ដូច្នេះ $(\sqrt{3} + \tan 1^\circ)(\sqrt{3} + \tan 2^\circ) \dots (\sqrt{3} + \tan 29^\circ) = 2^{29}$

លំហាត់ទី៣៦

ចូរគណនា $S = \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{2\pi}{7} + \sin^2 \frac{4\pi}{7}$

ដំណោះស្រាយ

គណនា $S = \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{2\pi}{7} + \sin^2 \frac{4\pi}{7}$

យើងបាន $S = \frac{1 - \cos \frac{2\pi}{7}}{2} + \frac{1 - \cos \frac{4\pi}{7}}{2} + \frac{1 - \cos \frac{8\pi}{7}}{2}$

$$= \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{8\pi}{7} \right)$$

តាំង $T = \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{8\pi}{7}$

$$= \cos \left(\pi - \frac{5\pi}{7} \right) + \cos \left(\pi - \frac{3\pi}{7} \right) + \cos \left(\pi + \frac{\pi}{7} \right)$$

$$= -\cos \frac{5\pi}{7} - \cos \frac{3\pi}{7} - \cos \frac{\pi}{7}$$

គុណអង្កទាំងពីរនឹង $2\sin\frac{\pi}{7}$ គេបាន ៖

$$2T \sin\frac{\pi}{7} = -2\cos\frac{5\pi}{7}\sin\frac{\pi}{7} - 2\cos\frac{3\pi}{7}\sin\frac{\pi}{7} - 2\cos\frac{\pi}{7}\sin\frac{\pi}{7}$$

តាមរូបមន្ត $2\cos a \sin b = \sin(a + b) - \sin(a - b)$

$$2T \sin\frac{\pi}{7} = -2\cos\frac{5\pi}{7}\sin\frac{\pi}{7} - 2\cos\frac{3\pi}{7}\sin\frac{\pi}{7} - 2\cos\frac{\pi}{7}\sin\frac{\pi}{7}$$

$$2T \sin\frac{\pi}{7} = -(\sin\frac{6\pi}{7} - \sin\frac{4\pi}{7}) - (\sin\frac{4\pi}{7} - \sin\frac{2\pi}{7}) - \sin\frac{2\pi}{7}$$

$$2T \sin\frac{\pi}{7} = -\sin\frac{6\pi}{7} = -\sin(\pi - \frac{\pi}{7}) = -\sin\frac{\pi}{7}$$

គេទាញ $T = -\frac{1}{2}$ នាំឱ្យ $S = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}(-\frac{1}{2}) = \frac{7}{4}$

ដូចនេះ $S = \sin^2\frac{\pi}{7} + \sin^2\frac{2\pi}{7} + \sin^2\frac{4\pi}{7} = \frac{7}{4}$ ។

លំហាត់ទី៣៧

ចូរគណនា $S = \sin \frac{2\pi}{7} + \sin \frac{4\pi}{7} + \sin \frac{8\pi}{7}$

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $\sin \frac{2\pi}{7} = \sin \frac{5\pi}{7}$, $\sin \frac{4\pi}{7} = \sin \frac{3\pi}{7}$, $\sin \frac{8\pi}{7} = -\sin \frac{\pi}{7}$

ហើយ $\sin \frac{2\pi}{7} > \sin \frac{\pi}{7} = -\sin \frac{8\pi}{7}$ នឹង $\sin \frac{4\pi}{7} > 0$

គេបាន $S = \sin \frac{5\pi}{7} + \sin \frac{3\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{7} > 0$

លើកអង្គទាំពីរជាការគេបាន ៖

$$S^2 = \sin^2 \frac{5\pi}{7} + \sin^2 \frac{3\pi}{7} + \sin^2 \frac{\pi}{7} + 2\sin \frac{5\pi}{7} \sin \frac{3\pi}{7} - 2\sin \frac{5\pi}{7} \sin \frac{\pi}{7} - 2\sin \frac{3\pi}{7} \sin \frac{\pi}{7}$$

$$\text{តាង } M = \sin^2 \frac{5\pi}{7} + \sin^2 \frac{3\pi}{7} + \sin^2 \frac{\pi}{7}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3}{2} - \frac{\cos \frac{10\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} + \cos \frac{2\pi}{7}}{2} \\
 &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left[\cos\left(\pi + \frac{3\pi}{7}\right) + \cos\left(\pi - \frac{\pi}{7}\right) + \cos\left(\pi - \frac{5\pi}{7}\right) \right] \\
 &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(-\cos \frac{3\pi}{7} - \cos \frac{\pi}{7} - \cos \frac{5\pi}{7} \right)
 \end{aligned}$$

យក $T = -\cos \frac{5\pi}{7} - \cos \frac{3\pi}{7} - \cos \frac{\pi}{7}$

គុណអង្គទាំងពីរនឹង $2\sin \frac{\pi}{7}$ គេបាន ៖

$$2T \sin \frac{\pi}{7} = -2\cos \frac{5\pi}{7} \sin \frac{\pi}{7} - 2\cos \frac{3\pi}{7} \sin \frac{\pi}{7} - 2\cos \frac{\pi}{7} \sin \frac{\pi}{7}$$

តាមរូបមន្ត $2\cos a \sin b = \sin(a + b) - \sin(a - b)$

$$2T \sin \frac{\pi}{7} = -2\cos \frac{5\pi}{7} \sin \frac{\pi}{7} - 2\cos \frac{3\pi}{7} \sin \frac{\pi}{7} - 2\cos \frac{\pi}{7} \sin \frac{\pi}{7}$$

$$2T \sin \frac{\pi}{7} = -\left(\sin \frac{6\pi}{7} - \sin \frac{4\pi}{7} \right) - \left(\sin \frac{4\pi}{7} - \sin \frac{2\pi}{7} \right) - \sin \frac{2\pi}{7}$$

$$2T \sin \frac{\pi}{7} = -\sin \frac{6\pi}{7} = -\sin\left(\pi - \frac{\pi}{7}\right) = -\sin \frac{\pi}{7}$$

គេទាញ $T = -\frac{1}{2}$ នាំឱ្យ $M = \frac{3}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

ពិធី $N = 2\sin\frac{5\pi}{7}\sin\frac{3\pi}{7} - 2\sin\frac{5\pi}{7}\sin\frac{\pi}{7} - 2\sin\frac{3\pi}{7}\sin\frac{\pi}{7}$
 $= \cos\frac{2\pi}{7} - \cos\frac{8\pi}{7} - \cos\frac{4\pi}{7} + \cos\frac{6\pi}{7} - \cos\frac{2\pi}{7} + \cos\frac{4\pi}{7}$
 $= \cos\frac{6\pi}{7} - \cos\frac{8\pi}{7} = -2\sin\pi \cdot \sin(-\frac{\pi}{7}) = 0$

គេបាន $S^2 = M + N = \frac{7}{4} + 0 = \frac{7}{4}$ ដោយ $S > 0$

នោះ $S = \frac{\sqrt{7}}{2}$ ។

ដូច្នេះ $S = \sin\frac{2\pi}{7} + \sin\frac{4\pi}{7} + \sin\frac{8\pi}{7} = \frac{\sqrt{7}}{2}$ ។

លំហាត់ទី៣៨

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$8\cos^3 \frac{n\pi}{7} + 4(-1)^n \cos^2 \frac{n\pi}{7} - 4\cos \frac{n\pi}{7} + (-1)^{n+1} = 0 \quad , \quad \forall n \in \mathbb{IN}$$

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $\sin \frac{4n\pi}{7} = \sin(n\pi - \frac{3n\pi}{7})$

$$2\sin \frac{2n\pi}{7} \cos \frac{2n\pi}{7} = \sin(n\pi) \cos \frac{3n\pi}{7} - \sin \frac{3n\pi}{7} \cos(n\pi)$$

$$4\sin \frac{n\pi}{7} \cos \frac{n\pi}{7} (2\cos^2 \frac{n\pi}{7} - 1) = 0 - (3\sin \frac{n\pi}{7} - 4\sin^3 \frac{n\pi}{7}) (-1)^n$$

$$4\sin \frac{n\pi}{7} \cos \frac{n\pi}{7} (2\cos^2 \frac{n\pi}{7} - 1) = -(-1)^n \cdot \sin \frac{n\pi}{7} (3 - 4\sin^2 \frac{n\pi}{7})$$

$$8\cos^3 \frac{n\pi}{7} - 4\cos \frac{n\pi}{7} = -(-1)^n \cdot [3 - 4(1 - \cos^2 \frac{n\pi}{7})]$$

$$8\cos^3 \frac{n\pi}{7} - 4\cos \frac{n\pi}{7} = -(-1)^n \cdot 4\cos^2 \frac{n\pi}{7} + (-1)^n$$

$$8\cos^3 \frac{n\pi}{7} + 4(-1)^n \cos^2 \frac{n\pi}{7} - 4\cos \frac{n\pi}{7} + (-1)^{n+1} = 0$$

ដូច្នេះនេះ: $8\cos^3 \frac{n\pi}{7} + 4(-1)^n \cos^2 \frac{n\pi}{7} - 4\cos \frac{n\pi}{7} + (-1)^{n+1} = 0 \quad , \quad \forall n \in \mathbb{IN}$

លំហាត់ទី៣៩

គេឲ្យកន្សោម

$$S = \cos^3 \frac{\pi}{7} + \cos^3 \frac{3\pi}{7} + \cos^3 \frac{5\pi}{7} \quad \text{និង} \quad T = \cos^4 \frac{\pi}{7} + \cos^4 \frac{3\pi}{7} + \cos^4 \frac{5\pi}{7}$$

ក. ចូរស្រាយថាបីចំនួន $\cos \frac{\pi}{7}$, $\cos \frac{3\pi}{7}$, $\cos \frac{5\pi}{7}$ ជាឫសរបស់សមីការ

$$(E) : 8x^3 - 4x^2 - 4x + 1 = 0 \quad \text{។}$$

ខ. ទាញរកតម្លៃ ៖

$$M = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}$$

$$N = \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7} + \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7}$$

$$\text{និង} \quad P = \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7} \quad \text{។}$$

$$\text{គ. គណនា} \quad Q = \cos^2 \frac{\pi}{7} + \cos^2 \frac{3\pi}{7} + \cos^2 \frac{5\pi}{7}$$

រួចទាញរកតម្លៃ S និង T ។

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថាបីចំនួន $\cos \frac{\pi}{7}$, $\cos \frac{3\pi}{7}$, $\cos \frac{5\pi}{7}$ ជាឫសរបស់សមីការ

$$(E) : 8x^3 - 4x^2 - 4x + 1 = 0$$

ពិធី $x_n = \cos \frac{2n-1}{7}\pi$, $n=1, 2, 3$ ជាឫសមីការ (E) គេបាន

$$8\cos^3 \frac{(2n-1)\pi}{7} - 4\cos^2 \frac{(2n-1)\pi}{7} - 4\cos \frac{(2n-1)\pi}{7} + 1 = 0$$

$$4\cos \frac{(2n-1)\pi}{7} \left(2\cos^2 \frac{(2n-1)\pi}{7} - 1 \right) + 1 - 4 \left(1 - \sin^2 \frac{(2n-1)\pi}{7} \right) = 0$$

$$4\cos \frac{(2n-1)\pi}{7} \cos \frac{2(2n-1)\pi}{7} - \left(3 - 4\sin^2 \frac{(2n-1)\pi}{7} \right) = 0$$

$$4 \cdot \frac{\sin \frac{2(2n-1)\pi}{7}}{2\sin \frac{(2n-1)\pi}{7}} \times \frac{\sin \frac{4(2n-1)\pi}{7}}{2\sin \frac{2(2n-1)\pi}{7}} - \frac{3\sin \frac{(2n-1)\pi}{7} - 4\sin^3 \frac{(2n-1)\pi}{7}}{\sin \frac{(2n-1)\pi}{7}} = 0$$

$$\frac{\sin \frac{4(2n-1)\pi}{7}}{\sin \frac{(2n-1)\pi}{7}} - \frac{\sin \frac{3(2n-1)\pi}{7}}{\sin \frac{(2n-1)\pi}{7}} = 0 \quad (*)$$

ដោយ $\forall n \in \mathbb{N} : \sin \frac{(2n-1)\pi}{7} \neq 0$

ហេតុសមីការ (*) សមមូល ៖

$$\sin \frac{4(2n-1)\pi}{7} - \sin \frac{3(2n-1)\pi}{7} = 0$$

$$2\sin \frac{(2n-1)\pi}{7} \cos \frac{(2n-1)\pi}{2} = 0$$

$$0 = 0 \text{ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ។}$$

ដូចនេះ $\cos \frac{\pi}{7}, \cos \frac{3\pi}{7}, \cos \frac{5\pi}{7}$ ជាឫសរបស់សមីការ (E) ។

ខ. ទាញរកតម្លៃ M , N , P

សន្មតថា $x_1 = \cos \frac{\pi}{7}, x_2 = \cos \frac{3\pi}{7}, x_3 = \cos \frac{5\pi}{7}$

តាមទ្រឹស្តីបទវ្យែតអនុគ្គន៍ក្នុងសមីការ $8x^3 - 4x^2 - 4x + 1 = 0$

$$M = x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} = +\frac{1}{2}$$

$$N = x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 = \frac{c}{a} = -\frac{1}{2}$$

និង $P = x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a} = -\frac{1}{8}$ ។

ដូចនេះ

$$M = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7} = \frac{1}{2}$$

$$N = \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7} + \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7} = -\frac{1}{2}$$

និង $P = \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7} \cos \frac{5\pi}{7} = -\frac{1}{8}$ ។

គ.គណនា $Q = \cos^2 \frac{\pi}{7} + \cos^2 \frac{3\pi}{7} + \cos^2 \frac{5\pi}{7}$

យើងបាន $Q = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)$$

$$= M^2 - 2N = \frac{1}{4} - 2\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4}$$

ដូចនេះ $Q = \cos^2 \frac{\pi}{7} + \cos^2 \frac{3\pi}{7} + \cos^2 \frac{5\pi}{7} = \frac{5}{4}$ ។

ទាញរកតម្លៃ S និង T

យើងបាន $S = \cos^3 \frac{\pi}{7} + \cos^3 \frac{3\pi}{7} + \cos^3 \frac{5\pi}{7}$

$$\text{ឬ } S = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$$

ដោយ $x_1 = \cos \frac{\pi}{7}$, $x_2 = \cos \frac{3\pi}{7}$, $x_3 = \cos \frac{5\pi}{7}$ ជាឫសរបស់ (E)

$$\text{នោះគេបាន } \begin{cases} 8x_1^3 - 4x_1^2 - 4x_1 + 1 = 0 & (1) \\ 8x_2^3 - 4x_2^2 - 4x_2 + 1 = 0 & (2) \\ 8x_3^3 - 4x_3^2 - 4x_3 + 1 = 0 & (3) \end{cases}$$

បូកសមីការ (1) , (2) , (3) អង្គនឹងអង្គគេបាន ៖

$$8(x_1^3 + x_2^3 + x_3^3) - 4(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - 4(x_1 + x_2 + x_3) + 3 = 0$$

$$8S - 4Q - 4M + 3 = 0$$

$$\text{គេទាញ } S = \frac{Q+M}{2} - \frac{3}{8} = \frac{\frac{5}{4} + \frac{1}{2}}{2} - \frac{3}{8} = \frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$$

$$\text{ដូចនេះ } S = \cos^3 \frac{\pi}{7} + \cos^3 \frac{3\pi}{7} + \cos^3 \frac{5\pi}{7} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$$\text{ម៉្យាទៀត } T = \cos^4 \frac{\pi}{7} + \cos^4 \frac{3\pi}{7} + \cos^4 \frac{5\pi}{7} = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4$$

ដោយគុណសមីការ (1) , (2) , (3) រៀងគ្នានឹង x_1 , x_2 , x_3

$$\text{គេបាន} \begin{cases} 8x_1^4 - 4x_1^3 - 4x_1^2 + x_1 = 0 & (1') \\ 8x_2^4 - 4x_2^3 - 4x_2^2 + x_2 = 0 & (2') \\ 8x_3^4 - 4x_3^3 - 4x_3^2 + x_3 = 0 & (3') \end{cases}$$

បូកសមីការ (1') , (2') , (3') អង្គនឹងអង្គគេបាន ៖

$$8T - 4S - 4Q + M = 0$$

$$\text{គេទាញ } T = \frac{S+Q}{2} - \frac{M}{8} = \frac{7}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } T = \cos^4 \frac{\pi}{7} + \cos^4 \frac{3\pi}{7} + \cos^4 \frac{5\pi}{7} = \frac{3}{4} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៤០

ចូរបង្ហាញថា ៖

$$\cos^7 x + \cos^7\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos^7\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = \frac{63}{64} \cos 3x$$

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ។

ដំណោះស្រាយ

$$\cos^7 x + \cos^7\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos^7\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = \frac{63}{64} \cos 3x$$

$$\text{ពិជ } E_n(x) = \cos^n x + \cos^n\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos^n\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) \quad (\text{i})$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } \cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$$

$$\text{គេទាញ } \cos^3 x = \frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{4}\cos 3x$$

ដោយគុណអង្គទាំងពីរនឹង $\cos^{n-3} x$ គេបាន៖

$$\cos^n x = \frac{3}{4}\cos^{n-2} x + \frac{1}{4}\cos 3x \cos^{n-3} x \quad (1)$$

ដូចគ្នាដែរគេទាញបាន៖

$$\cos^n\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{3}{4}\cos^{n-2}\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \frac{1}{4}\cos 3x \cos^{n-3}\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) \quad (2)$$

$$\cos^n\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = \frac{3}{4}\cos^{n-2}\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) + \frac{1}{4}\cos 3x \cos^{n-3}\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) \quad (3)$$

ដោយបូកសមីការ (1); (2) និង (3) គេបាន៖

$$E_n(x) = \frac{3}{4}E_{n-2}(x) + \frac{1}{4}\cos 3x E_{n-3}(x) \quad (ii)$$

តាម (i) ចំពោះ $n=0$; $n=1$, $n=2$ គេបាន៖

$$E_0(x) = 3$$

$$E_1(x) = \cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$E_1(x) = \cos x - \frac{1}{2}\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x = 0$$

$$E_2(x) = \cos^2 x + \left(-\frac{1}{2}\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\cos x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right)^2$$

$$E_2(x) = \frac{3}{2}\cos^2 x + \frac{3}{2}\sin^2 x = \frac{3}{2}$$

តាម (ii) ចំពោះ $n = 3 ; n = 4 , n = 5 ; n = 7$ គេបាន

$$E_3(x) = \frac{3}{4}E_1(x) + \frac{1}{4}\cos 3x E_0(x) = \frac{3}{4}\cos 3x$$

$$E_4(x) = \frac{3}{4}E_2(x) + \frac{1}{4}\cos 3xE_1(x) = \frac{9}{8}$$

$$E_5(x) = \frac{3}{4}E_3(x) + \frac{1}{4}\cos 3xE_2(x) = \frac{9}{16}\cos 3x + \frac{3}{8}\cos 3x = \frac{15}{16}\cos 3x$$

$$E_7(x) = \frac{3}{4}E_5(x) + \frac{1}{4}\cos 3xE_4(x) = \frac{45}{64}\cos 3x + \frac{9}{32}\cos 3x = \frac{63}{64}\cos 3x$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \cos^7 x + \cos^7\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos^7\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = \frac{63}{64}\cos 3x \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៤១

គេដឹងថា
$$\frac{\cos x + \cos y + \cos z}{\cos(x + y + z)} = \frac{\sin x + \sin y + \sin z}{\sin(x + y + z)} = a$$

ចូរស្រាយថា $\cos(x + y) + \cos(y + z) + \cos(z + x) = a$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយថា $\cos(x + y) + \cos(y + z) + \cos(z + x) = a$

តាង $u = e^{ix}$, $v = e^{iy}$, $w = e^{iz}$ គេបាន៖

$$u + v + w = (\cos x + \cos y + \cos z) + i(\sin x + \sin y + \sin z)$$

ហើយ $uvw = e^{i(x+y+z)} = \cos(x + y + z) + i \sin(x + y + z)$

គេមាន
$$\frac{\cos x + \cos y + \cos z}{\cos(x + y + z)} = \frac{\sin x + \sin y + \sin z}{\sin(x + y + z)} = a$$

នាំឲ្យ
$$\frac{(\cos x + \cos y + \cos z) + i(\sin x + \sin y + \sin z)}{\cos(x + y + z) + i \sin(x + y + z)} = a$$

$$\frac{u + v + w}{uvw} = a$$

$$\frac{1}{vw} + \frac{1}{uw} + \frac{1}{uv} = a$$

$$e^{-i(y+z)} + e^{-i(x+z)} + e^{-i(x+y)} = a$$

តាមសមភាពនេះគេទាញបាន ៖

$$\cos(x + y) + \cos(y + z) + \cos(z + x) = a$$

និង $\sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(z + x) = 0$

ដូច្នេះ $\cos(x + y) + \cos(y + z) + \cos(z + x) = a$ ។

លំហាត់ទី៤២

ចូរកំនត់គ្រប់តម្លៃ x ក្នុងចន្លោះ $]0; \frac{\pi}{2}[$ ដោយដឹងថា ៖

$$\frac{\sqrt{3}-1}{\sin x} + \frac{\sqrt{3}+1}{\cos x} = 4\sqrt{2}$$

ដំណោះស្រាយ

កំនត់គ្រប់តម្លៃ x ក្នុងចន្លោះ $]0; \frac{\pi}{2}[$

$$\frac{\sqrt{3}-1}{\sin x} + \frac{\sqrt{3}+1}{\cos x} = 4\sqrt{2} \quad (1)$$

$$\text{គេពិនិត្យ} \quad \sin \frac{\pi}{12} = \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$= \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{3}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

$$\text{ហើយ} \quad \cos \frac{\pi}{12} = \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}
 \end{aligned}$$

សមីការ (1) អាចសរសេរទៅជា ៖

$$\begin{aligned}
 &\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = 2 \\
 &\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = 2
 \end{aligned}$$

$$\frac{\sin \frac{\pi}{12}}{\sin x} + \frac{\cos \frac{\pi}{12}}{\cos x} = 2$$

$$\sin \frac{\pi}{12} \cos x + \sin x \cos \frac{\pi}{12} = 2 \sin x \cos x$$

$$\sin \left(\frac{\pi}{12} + x \right) = \sin 2x$$

ដោយ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ នោះគេទាញ $x = \frac{\pi}{12}$ ឬ $x = \frac{11\pi}{36}$

ដូចនេះ $x \in \left\{ \frac{\pi}{12} ; \frac{11\pi}{36} \right\}$ ។

លំហាត់ទី៤៣

ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$64x^6 - 112x^4 + 56x^2 - 7 = 2\sqrt{1-x^2} \quad ។$$

ដំណោះស្រាយ

$$64x^6 - 112x^4 + 56x^2 - 7 = 2\sqrt{1-x^2} \quad (1)$$

លក្ខខណ្ឌ $1-x^2 \geq 0$ ឬ $x \in [-1, 1]$

យើងមាន $\cos 4a = \cos(a + 3a)$

$$= \cos a \cos 3a - \sin a \sin 3a$$

$$= \cos a(4\cos^3 a - 3\cos a) - \sin a(3\sin a - 4\sin^3 a)$$

$$= 4\cos^4 a - 3\cos^2 a - 3\sin^2 a + 4\sin^4 a$$

$$= 4\cos^4 a + 4(1 - \cos^2 a)^2 - 3(\cos^2 a + \sin^2 a)$$

$$= 8\cos^4 a - 8\cos^2 a + 1$$

$$\cos 5a = \cos(a + 4a)$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$\begin{aligned}
 &= \cos a \cos 4a - \sin a \sin 4a \\
 &= \cos a(8\cos^4 a - 8\cos^2 a + 1) - 2\sin a \sin 2a \cos 2a \\
 &= 8\cos^5 a - 8\cos^3 a + \cos a - 4\sin^2 a \cos a(2\cos^2 a - 1) \\
 &= 8\cos^5 a - 8\cos^3 a + \cos a - 4(1 - \cos^2 a)(2\cos^3 a - \cos a) \\
 &= 16\cos^5 a - 20\cos^3 a + 5\cos a
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cos 6a &= 2\cos^2 3a - 1 = 2(4\cos^3 a - 3\cos a)^2 - 1 \\
 &= 32\cos^6 a - 48\cos^4 a + 18\cos^2 a - 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cos 7a &= \cos(6a + a) = \cos 6a \cos a - \sin 6a \sin a \\
 &= \cos a \cos 6a - 2\sin a \sin 3a \cos 3a \\
 &= \cos a \cos 6a - 2\sin a(3\sin a - 4\sin^3 a)(4\cos^3 a - 3\cos a) \\
 &= 64\cos^7 a - 112\cos^5 a + 56\cos^3 a - 7\cos a
 \end{aligned}$$

យក $x = \cos t$ ដែល $t \in [0, \pi]$ សមីការ (1) សរសេរ ៖

$$64\cos^6 t - 112\cos^4 t + 56\cos^2 t - 7 = 2\sqrt{1 - \cos^2 t}$$

$$64\cos^6 t - 112\cos^4 t + 56\cos^2 t - 7 = 2\sin t$$

គុណអង្គទាំងពីរនឹង $\cos t \neq 0$ គេបាន ៖

$$64\cos^7 t - 112\cos^5 t + 56\cos^3 t - 7\cos t = 2\sin t \cos t$$

$$\cos 7t = \sin 2t$$

$$\cos 7t = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2t\right)$$

គេទាញ
$$\begin{cases} 7t = \frac{\pi}{2} - 2t + 2k\pi \\ 7t = -\frac{\pi}{2} + 2t + 2k'\pi \end{cases}, k; k' \in \mathbb{Z}$$

សមមូល
$$\begin{cases} t = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{9} \\ t = -\frac{\pi}{10} + \frac{2k'\pi}{9} \end{cases}, k; k' \in \mathbb{Z}$$

ដោយ $t \in [0, \pi]$ គេទាញសំណុំតម្លៃ t ដូចខាងក្រោម ៖

$$t \in \left\{ \frac{\pi}{18}; \frac{5\pi}{18}; \frac{9\pi}{18}; \frac{13\pi}{18}; \frac{17\pi}{18}; \frac{3\pi}{10}; \frac{7\pi}{10} \right\} \text{ ដោយ } \cos t \neq 0 \text{ នោះ}$$

$t \neq \frac{\pi}{2}$ ដូចនេះសមីការ (1) មានសំណុំឬសដូចខាងក្រោម ៖

$$x \in \left\{ \cos \frac{\pi}{18}; \cos \frac{5\pi}{18}; \cos \frac{13\pi}{18}; \cos \frac{17\pi}{18}; \cos \frac{3\pi}{10}; \cos \frac{7\pi}{10} \right\}$$

លំហាត់ទី៤៤

ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$\tan^6 x + (\tan^2 x + 1)^3 + (\tan^2 x + 2)^3 = (\tan^2 x + 3)^3$$

ដំណោះស្រាយ

ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$\tan^6 x + (\tan^2 x + 1)^3 + (\tan^2 x + 2)^3 = (\tan^2 x + 3)^3 .$$

លក្ខខណ្ឌ $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ។

តាង $t = \tan^2 x$, $t \geq 0$ សមីការសរសេរ ៖

$$t^3 + (t+1)^3 + (t+2)^3 = (t+3)^3$$

$$t^3 + (t^3 + 3t^2 + 3t + 1) + (t^3 + 6t^2 + 12t + 8) = t^3 + 9t^2 + 27t + 27$$

$$3t^3 + 9t^2 + 15t + 9 = t^3 + 9t^2 + 27t + 27$$

$$2(t^3 - 6t - 9) = 0$$

$$(t^3 - 27) - (6t - 18) = 0$$

$$(t - 3)(t^2 + 3t + 9) - 6(t - 3) = 0$$

$$(t - 3)(t^2 + 3t + 3) = 0$$

គេទាញ $t - 3 = 0 \Rightarrow t = 3$

ឬ $t^2 + 3t + 3 = 0$ គ្មានឫសព្រោះ $\Delta = 9 - 12 < 0$

ចំពោះ $t = 3$ គេបាន $\tan^2 x = 3$

$$\tan^2 x - 3 = 0$$

$$(\tan x - \sqrt{3})(\tan x + \sqrt{3}) = 0$$

គេបាន $\tan x - \sqrt{3} = 0$ ឬ $\tan x = \sqrt{3}$

នាំឲ្យ $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ហើយ $\tan x + \sqrt{3} = 0$ ឬ $\tan x = -\sqrt{3}$

នាំឲ្យ $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

លំហាត់ទី៤៥

ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$4\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(x + \frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$$

ដំណោះស្រាយ

ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$4\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(x + \frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$$

តាមរូបមន្ត $2\sin a \cos b = \sin(a + b) + \sin(a - b)$

សមីការខាងលើអាចសរសេរជាបន្តបន្ទាប់ខាងក្រោម ៖

$$2 \left[\sin\left(x + \frac{\pi}{4} + x + \frac{\pi}{12}\right) + \sin\left(x + \frac{\pi}{4} - x - \frac{\pi}{12}\right) \right] = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$$

$$2 \left[\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\frac{\pi}{6} \right] = \sqrt{(1 + \sqrt{2})^2}$$

$$2\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 1 = 1 + \sqrt{2}$$

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

គេទាញ

$$\left[\begin{array}{l} 2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ 2x + \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi \end{array} \right. , k \in \mathbb{Z}$$

ដូចនេះ

$$\boxed{x = -\frac{\pi}{24} + k\pi \quad , \quad x = \frac{5\pi}{24} + k\pi \quad ; k \in \mathbb{Z}} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៤៦

១. ចូរស្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត ៖

$$\cos(n+1)x = 2\cos x \cos(nx) - \cos(n-1)x \quad , x \in \mathbb{R} , n \in \mathbb{IN}$$

២. អនុវត្តន៍ ៖ ចូរសរសេរ $\cos 7x$ ជាអនុគមន៍នៃ $\cos x$ ។

៣. ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$128\cos^7 x - 244\cos^5 x + 112\cos^3 x - 14\cos x - 1 = 0 \quad ។$$

ដំណោះស្រាយ

១. ស្រាយថា $\cos(n+1)x = 2\cos x \cos(nx) - \cos(n-1)x$

$$\cos(n+1)x + \cos(n-1)x = 2\cos \frac{(n+1)x - (n-1)x}{2} \cdot \cos \frac{(n+1)x + (n-1)x}{2}$$

សមមូល $\cos(n+1)x + \cos(n-1)x = 2\cos x \cdot \cos(nx)$

ដូចនេះ

$$\cos(n+1)x = 2\cos x \cos(nx) - \cos(n-1)x$$

២. អនុវត្តន៍ ៖ សរសេរ $\cos 7x$ ជាអនុគមន៍នៃ $\cos x$

$$\text{គេមាន } \cos(n+1)x = 2\cos x \cos(nx) - \cos(n-1)x \quad .$$

$$\text{បើ } n=1 \quad \cos 2x = 2\cos^2 x - 1$$

$$\text{បើ } n=2 \quad \cos 3x = 2\cos x \cos 2x - \cos x$$

$$= 2\cos x(2\cos^2 x - 1) - \cos x$$

$$= 4\cos^3 x - 3\cos x$$

$$\text{បើ } n=3 \quad \cos 4x = 2\cos x \cos 3x - \cos 2x$$

$$= 2\cos x(4\cos^3 x - 3\cos x) - (2\cos^2 x - 1)$$

$$= 8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1$$

$$\text{បើ } n=4 \quad \cos 5x = 2\cos x \cos 4x - \cos 3x$$

$$= 2\cos x(8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1) - (4\cos^3 x - 3\cos x)$$

$$= 16\cos^5 x - 20\cos^3 x + 5\cos x$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$\begin{aligned} \text{បើ } n = 5 \quad \cos 6x &= 2 \cos x \cos 5x - \cos 4x \\ &= 2 \cos x (16 \cos^5 x - 20 \cos^3 x + 5 \cos x) - (8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1) \\ &= 32 \cos^6 x - 48 \cos^4 x + 18 \cos^2 x - 1 \end{aligned}$$

$$\text{បើ } n = 6 \quad \cos 7x = 2 \cos x \cos 6x - \cos 5x$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\cos 7x = 64 \cos^7 x - 112 \cos^5 x + 56 \cos^3 x - 7 \cos x}.$$

៣. ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$128 \cos^7 x - 244 \cos^5 x + 112 \cos^3 x - 14 \cos x - 1 = 0 \quad (1)$$

ចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការ (1) នឹង 2 គេបាន ៖

$$\begin{aligned} 64 \cos^7 x - 112 \cos^5 x + 56 \cos^3 x - 7 \cos x - \frac{1}{2} &= 0 \\ \cos 7x &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{គេទាញបាន } 7x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ឬ} \quad x = \pm \frac{\pi}{21} + \frac{2k\pi}{7}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ដូចនេះ: } x = \frac{\pi}{21} + \frac{2k\pi}{7}, \quad x = -\frac{\pi}{21} + \frac{2k'\pi}{7}; \quad k; k' \in \mathbb{Z} \quad \checkmark$$

លំហាត់ទី៤៧

ក. ចូរគណនាតម្លៃប្រាកដនៃ $\tan \frac{\pi}{8}$

ខ. ចូរដោះស្រាយសមីការ

$$\sin^2 x - \sqrt{2} \sin x \cdot \cos x + (\sqrt{2} - 1) \cos^2 x = 0$$

គ. ចូរដោះស្រាយសមីការ $\frac{\tan x + \sqrt{2} - 1}{1 - (\sqrt{2} - 1) \tan x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

ដំណោះស្រាយ

ក. គណនាតម្លៃប្រាកដនៃ $\tan \frac{\pi}{8}$

តាមរូបមន្ត $\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$ ដោយយកតម្លៃ $a = \frac{\pi}{8}$

$$\text{គឺបាន } \tan \frac{\pi}{4} = \frac{2 \tan \frac{\pi}{8}}{1 - \tan^2 \frac{\pi}{8}}$$

$$1 = \frac{2 \tan \frac{\pi}{8}}{1 - \tan^2 \frac{\pi}{8}} \quad \text{នាំឱ្យ} \quad \tan^2 \frac{\pi}{8} + 2 \tan \frac{\pi}{8} - 1 = 0$$

តាំង $t = \tan \frac{\pi}{8}$ ដែល $t > 0$

គេបាន $t^2 + 2t - 1 = 0$; $\Delta' = 1 + 1 = 2$

គេទាញឫស $t_1 = -1 + \sqrt{2}$, $t_2 = -1 - \sqrt{2} < 0$ (មិនយក)

ដូចនេះ: $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$\sin^2 x - \sqrt{2} \sin x \cdot \cos x + (\sqrt{2} - 1) \cos^2 x = 0$$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង $\cos^2 x \neq 0$ គេបានសមីការ ៖

$$\tan^2 x - \sqrt{2} \tan x + (\sqrt{2} - 1) = 0 \quad .$$

តាំង $t = \tan x$ គេបាន ៖

$$t^2 - \sqrt{2} t + (\sqrt{2} - 1) = 0 \quad \text{ដោយ } a + b + c = 0$$

គេទាញយក $t_1 = 1$; $t_2 = \sqrt{2} - 1$ ។

-ចំពោះ $t = 1$ គេបាន $\tan x = 1$ នាំឱ្យ $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

-ចំពោះ $t = \sqrt{2} - 1$ គេបាន $\tan x = \sqrt{2} - 1$

នាំឱ្យ $x = \frac{\pi}{8} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

ដូចនេះ $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $x = \frac{\pi}{8} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$\frac{\tan x + \sqrt{2} - 1}{1 - (\sqrt{2} - 1) \tan x} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{ដោយ } \tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1 \text{ គេបាន}$$

$$\frac{\tan x + \tan \frac{\pi}{8}}{1 - \tan x \cdot \tan \frac{\pi}{8}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\tan\left(x + \frac{\pi}{8}\right) = \tan \frac{\pi}{6}$$

$$\text{គេទាញ } x + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{6} + k\pi \text{ ឬ } x = \frac{\pi}{24} + k\pi , k \in \mathbb{Z}$$

លំហាត់ទី៤៨

ក. ចូរគណនាតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\cos \frac{7\pi}{12}$

ខ. ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ ៖

$$\begin{cases} \cos^3 x + 3 \cos x \cos^2 y = \frac{\sqrt{2} + 3\sqrt{6}}{8} \\ 3 \cos^2 x \cos y + \cos^3 y = \frac{\sqrt{2} - 3\sqrt{6}}{8} \end{cases}$$

ដំណោះស្រាយ

ក. គណនាតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\cos \frac{7\pi}{12}$

យើងបាន $\cos \frac{\pi}{12} = \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right)$

$$\begin{aligned} &= \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

ហើយ $\cos \frac{7\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right)$

$$= \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$$

ដូចនេះ: $\left[\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}, \quad \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \right]$ ។

ខ. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ៖

$$\begin{cases} \cos^3 x + 3 \cos x \cos^2 y = \frac{\sqrt{2} + 3\sqrt{6}}{8} & (1) \\ 3 \cos^2 x \cos y + \cos^3 y = \frac{\sqrt{2} - 3\sqrt{6}}{8} & (2) \end{cases}$$

បូកសមីការ (1) និង (2) អង្កនិងអង្កគេបាន ៖

$$\cos^3 x + 3 \cos^2 x \cos y + 3 \cos x \cos^2 y + \cos^3 y = \frac{2\sqrt{2}}{8}$$

$$(\cos x + \cos y)^3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3$$

$$\cos x + \cos y = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3)$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ដកសមីការ (1) និង (2) អង្កនិងអង្កគេបាន ៖

$$\begin{aligned} \cos^3 x - 3\cos^2 x \cos y + 3\cos x \cos^2 y - \cos^3 y &= \frac{6\sqrt{6}}{8} \\ (\cos x - \cos y)^3 &= \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^3 \\ \cos x - \cos y &= \frac{\sqrt{6}}{2} \quad (4) \end{aligned}$$

បូកសមីការ (3) និង (4) អង្កនិងអង្កគេបាន ៖

$$\begin{aligned} 2\cos x &= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} \\ \cos x &= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

$$\cos x = \cos \frac{\pi}{12} \quad \text{នាំឲ្យ} \quad x = \pm \frac{\pi}{12} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

ដកសមីការ (3) និង (4) អង្កនិងអង្កគេបាន ៖

$$\begin{aligned} 2\cos y &= \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2} \\ \cos y &= \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$\cos y = \cos \frac{7\pi}{12} \quad \text{នាំឱ្យ} \quad y = \pm \frac{7\pi}{12} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } x = \pm \frac{\pi}{12} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{និង} \quad y = \pm \frac{7\pi}{12} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

លំហាត់ទី៤៩

ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x$

ខ. ចូរដោះស្រាយសមីការ $(\sin^3 x + \cos^3 x)^2 = \frac{13}{16} + \frac{1}{4} \sin^3 2x$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x$

យើងមាន $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad ; \forall x \in \mathbb{R}$

$$(\sin^2 x + \cos^2 x)^3 = 1$$

$$\sin^6 x + 3\sin^4 x \cos^2 x + 3\sin^2 x \cos^4 x + \cos^6 x = 1$$

$$\sin^6 x + \cos^6 x + 3\sin^2 x \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) = 1$$

$$\sin^6 x + \cos^6 x + 3\sin^2 x \cos^2 x = 1$$

$$\sin^6 x + \cos^6 x + \frac{3}{4} \sin^2 2x = 1$$

$$\sin^6 x + \cos^6 x + \frac{3}{4} \left(\frac{1 - \cos 4x}{2} \right) = 1$$

$$\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - \frac{3}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $(\sin^3 x + \cos^3 x)^2 = \frac{13}{16} + \frac{1}{4}\sin^3 2x$

យើងបាន $\sin^6 x + 2\sin^3 x \cos^3 x + \cos^6 x = \frac{13}{16} + 2\sin^3 x \cos^3 x$

$$\frac{5}{8} + \frac{3}{4}\cos 4x = \frac{13}{16} \quad \text{ឬ} \quad \cos 4x = \frac{1}{2}$$

គេទាញ $4x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ឬ} \quad x = \pm \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{។}$

លំហាត់ទី៥០

គេមានសមីការដឺក្រេទីពីរ ៖

$$(E) : x^2 + \left(\frac{1}{\cos \phi} - 2 \right) x + \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 = 0$$

$$\text{ដែល } 0 \leq \phi < \frac{\pi}{2} \text{ ។}$$

គេឧបមាថាសមីការ (E) មានឫសពីរដែលតាងដោយ **tan a**

និង **tan b** ។

ក. កំនត់តម្លៃ ϕ ដើម្បីឲ្យ $a + b = \frac{\pi}{4}$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ (E) ចំពោះតម្លៃ ϕ ដែលបានរកឃើញ

គ. ប្រើលទ្ធផលខាងលើចូរទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\tan \frac{\pi}{12}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. កំនត់តម្លៃ ϕ ដើម្បីឲ្យ $a + b = \frac{\pi}{4}$

ដោយ $\tan a$ និង $\tan b$ ជាបួសរបស់ (E) នោះគេមានទំនាក់ទំនង

$$\tan a + \tan b = 2 - \frac{1}{\cos \phi} \quad (1)$$

និង $\tan a \tan b = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 \quad (2)$

តាមរូបមន្ត $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad (3)$

យកទំនាក់ទំនង (1) និង (2) ជំនួសក្នុង (3) គេបាន ៖

$$\tan(a + b) = \frac{2 - \frac{1}{\cos \phi}}{1 - (\frac{2}{\sqrt{3}} - 1)} = \frac{\sqrt{3}(2 \cos \phi - 1)}{(2\sqrt{3} - 2) \cos \phi}$$

ដោយ $a + b = \frac{\pi}{4}$

គេទាញបាន $\frac{\sqrt{3}(2\cos\phi - 1)}{(2\sqrt{3} - 2)\cos\phi} = 1$

$$2\sqrt{3}\cos\phi - \sqrt{3} = 2\sqrt{3}\cos\phi - 2\cos\phi$$

$$\cos\phi = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

ដោយ $0 \leq \phi < \frac{\pi}{2}$ ដូចនេះគេទាញ $\phi = \frac{\pi}{6}$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ (E) ៖

បើ $\phi = \frac{\pi}{6}$ នោះ (E) $x^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 2\right)x + \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 = 0$

$$\Delta = \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 2\right)^2 - 4\left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)$$

$$\Delta = \frac{4(7 - 4\sqrt{3})}{3} = \frac{4(2 - \sqrt{3})^2}{3}$$

គេទាញប្រស $\left[\begin{array}{l} x_1 = \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} + 2 + \frac{4 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ x_2 = \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} + 2 - \frac{4 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right) = 2 - \sqrt{3} \end{array} \right.$

ដូចនេះ $x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $x_2 = 2 - \sqrt{3}$ ។

គ. ប្រើលទ្ធផលខាងលើទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\tan \frac{\pi}{12}$

តាមសម្រាយខាងលើគេមាន $x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $x_2 = 2 - \sqrt{3}$

គេទាញ $\tan a = \frac{1}{\sqrt{3}}$ និង $\tan b = 2 - \sqrt{3}$

ដោយ $\tan a = \frac{1}{\sqrt{3}}$ នាំឲ្យ $a = \frac{\pi}{6}$ ហើយ $a + b = \frac{\pi}{4}$

នាំឲ្យ $b = \frac{\pi}{4} - a = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12}$

ដូចនេះ $\tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$ ។

លំហាត់ទី៥១

គេឲ្យខ្សែកោង

$$(P) : y = f(x) = x^2 \sin \phi - 2(1 + \sin \phi)x + 5 - \sin \phi$$

ដែល $0 < \phi < \pi$ ។

កំនត់តម្លៃ ϕ ដើម្បីឲ្យខ្សែកោង (P) ស្ថិតនៅលើអក្សរ

អាប៊ីស៊ីសជានិច្ច ។

ដំណោះស្រាយ

កំនត់តម្លៃ ϕ

គេមាន

$$(P) : y = f(x) = x^2 \sin \phi - 2(1 + \sin \phi)x + 5 - \sin \phi$$

ដើម្បីឲ្យ(P) ស្ថិតនៅលើអក្សរអាប៊ីស៊ីសជានិច្ចលុះត្រាតែ

$$f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{ពេលគឺគេត្រូវឲ្យ} \begin{cases} \mathbf{a_f > 0} \\ \mathbf{\Delta' < 0} \end{cases}$$

$$\text{គេមាន } \mathbf{a_f = \sin \phi > 0} \quad ; \quad \forall \phi \in] 0 ; \pi [$$

$$\text{ហើយ } \mathbf{\Delta' = (1 + \sin \phi)^2 - \sin \phi(5 - \sin \phi)}$$

$$\mathbf{\Delta' = 1 + 2\sin \phi + \sin^2 \phi - 5\sin \phi + \sin^2 \phi}$$

$$\mathbf{\Delta' = 2\sin^2 \phi - 3\sin \phi + 1}$$

$$\mathbf{\Delta' = (2\sin \phi - 1)(\sin \phi - 1)}$$

$$\text{បើ } \mathbf{\Delta' < 0} \quad \text{សមមូល } \mathbf{\frac{1}{2} < \sin \phi < 1} \quad \text{ដោយ } \mathbf{0 < \phi < \pi}$$

$$\text{គេទាញបាន } \mathbf{\frac{\pi}{6} < \phi < \frac{\pi}{2}} \quad \text{។}$$

ដូចនេះដើម្បីឲ្យខ្សែកោង (P) ស្ថិតនៅលើអក្សរអាប៊ីស៊ីស

$$\text{ជានិច្ចលុះត្រាតែគេឲ្យលក្ខខ័ណ្ឌ } \mathbf{\frac{\pi}{6} < \phi < \frac{\pi}{2}} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៥២

គេឲ្យសមីការដឺក្រេទីពីរ (E) : $x^2 - (m^2 - m)x - m + 2 = 0$

គេសន្មតថាសមីការនេះមានឫសពីរតាងរៀងគ្នាដោយ $\tan a$

និង $\tan b$ ។

ក. ចូរកំនត់តម្លៃនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m ដើម្បីឲ្យ $a + b = \frac{\pi}{3}$ ។

ខ. ចូរដោះស្រាយសមីការខាងលើចំពោះ m ដែលបានរកឃើញ ។

គ. ដោយប្រើលទ្ធផលខាងលើចូរទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\tan \frac{\pi}{12}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. កំនត់តម្លៃនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m ដើម្បីឲ្យ $a + b = \frac{\pi}{3}$ ៖

សមីការមានឫសកាលណា $\Delta = (m^2 - m)^2 + 4m - 8 \geq 0$

ដោយ $\tan a$ និង $\tan b$ ជាឫសរបស់សមីការនោះ

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

តាមទ្រឹស្តីបទវ្យែតគេមាន $\begin{cases} \tan a + \tan b = m^2 - m & (1) \\ \tan a \cdot \tan b = -m + 2 & (2) \end{cases}$

ដោយ $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$

$$\tan \frac{\pi}{3} = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$$

$$\sqrt{3} = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b} \quad (3)$$

យកទំនាក់ទំនង (1) និង (2) ជួសក្នុងសមីការ (3)

គេបាន ៖

$$\sqrt{3} = \frac{m^2 - m}{1 + m - 2} \quad \text{ឬ} \quad m^2 - (1 + \sqrt{3})m + \sqrt{3} = 0$$

ដោយ $a + b + c = 0$ គេទាញប្រសិន $m_1 = 1$, $m_2 = \sqrt{3}$

-ចំពោះ $m = 1$ នោះ $\Delta = (1^2 - 1)^2 + 4 \cdot 1 - 9 = -4 < 0$ (មិនយក)

-ចំពោះ $m = \sqrt{3}$ នោះ $\Delta = (3 - \sqrt{3})^2 + 4\sqrt{3} - 8 = 4 - 2\sqrt{3} > 0$

ដូចនេះ $m = \sqrt{3}$ ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ខ.ដោះស្រាយសមីការខាងលើចំពោះ m ដែលបានរកឃើញ ៖

ចំពោះ $m = \sqrt{3}$ គេបាន ៖ $x^2 - (3 - \sqrt{3})x - \sqrt{3} + 2 = 0$

ដោយ $a + b + c = 0$ គេទាញយក $x_1 = 1$, $x_2 = 2 - \sqrt{3}$ ។

គ.ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\tan \frac{\pi}{12}$ ៖

តាមលទ្ធផលខាងលើគេមាន $x_1 = \tan a = 1$ នាំឱ្យ $a = \frac{\pi}{4}$

ហើយ $a + b = \frac{\pi}{3}$ នោះ $b = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$

ហេតុនេះ $x_2 = \tan b = \tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$

ដូចនេះ $\tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$ ។

លំហាត់ទី៥៣

គេឲ្យសមីការ (E) : $x^3 - (2m + 3)x^2 + 5x - 3m + 2 = 0$

ឧបមាថាសមីការនេះមានឫបីតាងដោយ $\tan \alpha$, $\tan \beta$, $\tan \gamma$ ។

ក. ចូរគណនា $A = \frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)}{\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$ ជាអនុគមន៍នៃ m ។

ខ. កំនត់ m ដើម្បីឲ្យ $A = 4$ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ (E) ចំពោះតម្លៃ m ដែលបានរកឃើញខាងលើ

ដំណោះស្រាយ

ក. គណនា $A = \frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)}{\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$ ជាអនុគមន៍នៃ m

យើងមាន $A = \frac{\sin[\alpha + (\beta + \gamma)]}{\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sin \alpha \cos(\beta + \gamma) + \sin(\beta + \gamma) \cos \alpha}{\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma} \\
 &= \frac{\sin \alpha \cos \beta \cos \gamma - \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma + \sin \beta \cos \gamma \cos \alpha + \sin \gamma \cos \beta \cos \alpha}{\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma} \\
 &= \tan \alpha - \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma + \tan \beta + \tan \gamma \\
 &= \tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma - \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma
 \end{aligned}$$

ដោយ $\tan \alpha$, $\tan \beta$, $\tan \gamma$ ជាឫសសមីការ (E) តាមទ្រឹស្តីបទវ្យែត

$$\text{យើងមាន } \begin{cases} \tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma = 2m + 3 \\ \tan \alpha \tan \beta + \tan \beta \tan \gamma + \tan \gamma \tan \alpha = 5 \\ \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma = 3m - 2 \end{cases}$$

យើងបាន $A = 2m + 3 - (3m - 2) = -m + 5$

ដូចនេះ $A = -m + 5$ ។

ខ.កំនត់ m ដើម្បីឲ្យ $A = 4$

ដោយយើងមាន $A = -m + 5$

យើងបាន $-m + 5 = 4$ នាំឲ្យ $m = 1$ ។

គ. ដោះស្រាយសមីការ (E) ៖

ចំពោះ $m = 1$ គេបាន (E): $x^3 - 5x^2 + 5x - 1 = 0$

ដោយ $x^3 - 5x^2 + 5x - 1 = (x - 1)(x^2 - 4x + 1)$

គេទាញ $(x - 1)(x^2 - 4x + 1) = 0$ ឬ $\begin{cases} x = 1 \\ x^2 - 4x + 1 = 0 \end{cases}$

$\Delta' = 4 - 1 = 3$ គេទាញ $x_1 = 2 - \sqrt{3}$, $x_2 = 2 + \sqrt{3}$

ដូចនេះសំណុំឬសសមីការ $x \in \{ 2 - \sqrt{3} ; 1 , 2 + \sqrt{3} \}$ ។

លំហាត់ទី៥៤

គេឲ្យសមីការ (E) : $\cos^3 x \cos 3x + \sin^3 x \sin 3x = m$

ក. ចូរដោះស្រាយសមីការនេះកាលណា $m = \frac{3\sqrt{3}}{8}$

ខ. រកលក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ m ដើម្បីឲ្យសមីការនេះមានឫស ។

ដំណោះស្រាយ

ក. ដោះស្រាយសមីការនេះកាលណា $m = \frac{3\sqrt{3}}{8}$

យើងមាន $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ នាំឲ្យ

$$\sin^3 x = \frac{1}{4}(3 \sin x - \sin 3x)$$

ហើយ $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$

នាំឲ្យ $\cos^3 x = \frac{1}{4}(3 \cos x + \cos 3x)$

សមីការ (E) អាចសរសេរ ៖

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$\frac{1}{4}(3\cos x + \cos 3x)\cos 3x + \frac{1}{4}(3\sin x - \sin 3x)\sin 3x = m$$

$$3\cos x \cos 3x + \cos^2 3x + 3\sin x \sin 3x - \sin^2 3x = 4m$$

$$3(\cos 3x \cos x + \sin 3x \sin x) + (\cos^2 3x - \sin^2 3x) = 4m$$

$$3\cos 2x + \cos 6x = 4m$$

$$4\cos^3 2x = 4m$$

$$\cos 2x = \sqrt[3]{m}$$

ដោយ $m = \frac{3\sqrt{3}}{8}$ គេបាន $\cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

នាំឲ្យ $x = \pm \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

ខ. រកលក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ m ៖

ដើម្បីឲ្យសមីការនេះមានឫសគេគ្រាន់តែឲ្យ $-1 \leq \sqrt[3]{m} \leq 1$

ឬ $m \in [-1, 1]$ ។

លំហាត់ទី៥៥

ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$\log_{\sqrt{2}}^2(\sin x) + \log_{\sqrt{2}}(2\sin^3 x) = 0$$

ដំណោះស្រាយ

ដោះស្រាយសមីការ ៖

$$\log_{\sqrt{2}}^2(\sin x) + \log_{\sqrt{2}}(2\sin^3 x) = 0$$

លក្ខខណ្ឌ $\sin x > 0$ នាំឱ្យ $2k\pi < x < \pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

សមីការអាចសរសេរ ៖

$$\log_{\sqrt{2}}^2(\sin x) + \log_{\sqrt{2}}(\sin^3 x) + \log_{\sqrt{2}} 2 = 0$$

$$\log_{\sqrt{2}}^2(\sin x) + 3\log_{\sqrt{2}}(\sin x) + 2 = 0$$

តាង $t = \log_{\sqrt{2}}(\sin x)$ គេបានសមីការ $t^2 + 3t + 2 = 0$

ដោយ $b = a + c$ គេទាញប្រសិ $t_1 = -1$, $t_2 = -2$

-ចំពោះ $t = -1$ គេបាន $\log_{\sqrt{2}}(\sin x) = -1$

សមមូល $\sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$

នាំឱ្យ $\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z} \end{array} \right.$

-ចំពោះ $t = -2$ គេបាន $\log_{\sqrt{2}}(\sin x) = -2$

សមមូល $\sin x = \frac{1}{2}$

នាំឱ្យ $\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z} \end{array} \right.$

លំហាត់ទី៥៦

គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (U_n) កំណត់លើ \mathbb{IN} ដោយ ៖

$$U_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ និង } U_{n+1} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - U_n^2}}{2}}, \forall n \in \mathbb{IN}$$

គណនា U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

ដំណោះស្រាយ

គណនា U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ៖

$$\text{យើងមាន } U_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4}$$

$$U_1 = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - U_0^2}}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - \sin^2 \frac{\pi}{4}}}{2}} = \sin \frac{\pi}{8}$$

ឧបមាថាវាពិតដល់តួទី p គឺ $U_p = \sin \frac{\pi}{2^{p+2}}$

យើងនឹងស្រាយថាវាពិតដល់តួទី $(p+1)$ គឺ $U_{p+1} = \sin \frac{\pi}{2^{p+3}}$ ពិត

យើងមាន $U_{p+1} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - U_p^2}}{2}}$

តែតាមការឧបមា $U_p = \sin \frac{\pi}{2^{p+2}}$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } U_{p+1} &= \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - \sin^2 \frac{\pi}{2^{p+2}}}}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{1 - \cos \frac{\pi}{2^{p+2}}}{2}} = \sqrt{\frac{2 \sin^2 \frac{\pi}{2^{p+3}}}{2}} \\ &= \sin \frac{\pi}{2^{p+3}} \end{aligned}$$

ដូចនេះ:
$$U_n = \sin \frac{\pi}{2^{n+2}} \quad \square \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៥៧

គេឲ្យ $a_0 = \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}$ និង $a_{n+1} = \frac{a_n^2 - 5}{2(a_n + 2)}$

ចំពោះគ្រប់ $n \geq 0$ ។

ចូរស្រាយថា $a_n = \cot\left(\frac{2^{n-3}\pi}{3}\right) - 2$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយថា $a_n = \cot\left(\frac{2^{n-3}\pi}{3}\right) - 2$

ចំពោះ $n = 0$ គេបាន $a_0 = \cot\frac{\pi}{24} - 2$

$$\begin{aligned} \cot\frac{\pi}{24} &= \frac{\cos\frac{\pi}{24}}{\sin\frac{\pi}{24}} = \frac{2\cos^2\frac{\pi}{24}}{2\sin\frac{\pi}{24}\cos\frac{\pi}{24}} = \frac{1 + \cos\frac{\pi}{12}}{\sin\frac{\pi}{12}} \\ &= \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1 + \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}} = \frac{4 + \sqrt{6} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cot \frac{\pi}{24} &= \frac{4(\sqrt{6} + \sqrt{2}) + (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2}{4} \\ &= \frac{4(\sqrt{6} + \sqrt{2}) + 8 + 4\sqrt{3}}{4} \\ &= 2 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6} \end{aligned}$$

គេទាញ $a_0 = \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}$

ហេតុនេះ $a_n = \cot\left(\frac{2^{n-3}\pi}{3}\right) - 2$ ពិតចំពោះ $n = 0$ ។

សន្មតថាវាពិតដល់តួទី k គឺ $a_k = \cot\left(\frac{2^{k-3}\pi}{3}\right) - 2$ ពិត

យើងនឹងស្រាយថាវាពិតដល់តួទី $k + 1$ គឺ ៖

$$a_{k+1} = \cot\left(\frac{2^{k-2}\pi}{3}\right) - 2 \quad \text{ពិត ។}$$

យើងមាន $a_{k+1} = \frac{a_k^2 - 5}{2(a_k + 2)}$ ដោយ $a_k = \cot\left(\frac{2^{k-3}\pi}{3}\right) - 2$

$$\text{នៅ: } a_{k+1} = \frac{\left[\cot\left(\frac{2^{k-3}\pi}{3}\right) - 2 \right]^2 - 5}{2 \cot\left(\frac{2^{k-3}\pi}{3}\right)}$$

$$a_{k+1} = \frac{\cot^2\left(\frac{2^{k-3}\pi}{3}\right) - 4 \cot\left(\frac{2^{k-3}\pi}{3}\right) - 1}{2 \cot\left(\frac{2^{k-3}\pi}{3}\right)}$$

$$= \frac{\cot^2\left(\frac{2^{k-3}\pi}{3}\right) - 1}{2 \cot\left(\frac{2^{k-3}\pi}{3}\right)} - 2$$

ដោយប្រើរូបមន្ត $\cot 2a = \frac{\cot^2 a - 1}{2 \cot a}$

គេបាន $a_{k+1} = \cot\left(\frac{2^{k-2}\pi}{3}\right) - 2$ ពិត ។

ដូចនេះ $a_n = \cot\left(\frac{2^{n-3}\pi}{3}\right) - 2$ ។

លំហាត់ទី៥៨

គេឱ្យ $\sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{2^2}$, $\sqrt{2 + \sqrt{2}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^3}$, $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^4}$

ពីឧទាហរណ៍ខាងលើចូររករូបមន្តទូទៅ និង ស្រាយបញ្ជាក់

រូបមន្តនោះផង ។

ដំណោះស្រាយ

រករូបមន្តទូទៅ ៖

គេមាន $\sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{2^2}$, $\sqrt{2 + \sqrt{2}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^3}$,

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^4}$$

តាមលំនាំឧទាហរណ៍យើងអាចទាញរករូបមន្តទូទៅដូចខាងក្រោម ៖

$$\sqrt{\underbrace{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}_{(n)}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$$

 ។

ស្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តនេះ ៖

យើងតាង $A_n = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}}_{(n)}$ គ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

យើងមាន $A_1 = \sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{2^2}$ ពិត

យើងឧបមាថាវាពិតដល់តួទី p គឺ ៖

$A_p = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}}_{(p)} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{p+1}}$ ពិត

យើងនឹងស្រាយថាវាពិតដល់តួទី $p+1$ គឺ $A_{p+1} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{p+2}}$ ពិត

យើងមាន $A_{p+1} = \sqrt{2 + A_p}$

ដោយតាមការឧបមា $A_p = 2 \cos \frac{\pi}{2^{p+1}}$

យើងបាន $A_{p+1} = \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{2^{p+1}}} = \sqrt{4 \cos^2 \frac{\pi}{2^{p+2}}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{p+2}}$ ពិត

ដូចនេះ: $\boxed{\underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}}_{(n)} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}}$ ។

លំហាត់ទី៥៩

គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (U_n) កំនត់ដោយ $U_n = \sqrt{2}^n \cdot \sin \frac{n\pi}{4}$

ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។

ក-ចូរបង្ហាញថា $\sqrt{2} \cdot \cos \frac{(n+1)\pi}{4} = \cos \frac{n\pi}{4} - \sin \frac{n\pi}{4}$

ខ-ទាញឲ្យបានថា $U_n = (\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4} - (\sqrt{2})^{n+1} \cos \frac{(n+1)\pi}{4}$

គ-គណនាផលបូក ៖

$S_n = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n$ ជាអនុគមន៍នៃ n ។

ដំណោះស្រាយ

ក-ចូរបង្ហាញថា $\sqrt{2} \cdot \cos \frac{(n+1)\pi}{4} = \cos \frac{n\pi}{4} - \sin \frac{n\pi}{4}$

តាមរូបមន្ត $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

$$\begin{aligned}\sqrt{2} \cos \frac{(n+1)\pi}{4} &= \sqrt{2} \cos \left(\frac{n\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{n\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{n\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} \right)\end{aligned}$$

$$\sqrt{2} \cos \frac{(n+1)\pi}{4} = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \frac{n\pi}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{n\pi}{4} \right) = \cos \frac{n\pi}{4} - \sin \frac{n\pi}{4}$$

ដូច្នេះនេះ: $\boxed{\sqrt{2} \cdot \cos \frac{(n+1)\pi}{4} = \cos \frac{n\pi}{4} - \sin \frac{n\pi}{4}}$ ។

ខ-ទាញឲ្យបានថា $U_n = (\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4} - (\sqrt{2})^{n+1} \cos \frac{(n+1)\pi}{4}$

យើងមាន $\sqrt{2} \cdot \cos \frac{(n+1)\pi}{4} = \cos \frac{n\pi}{4} - \sin \frac{n\pi}{4}$

នាំឲ្យ $\sin \frac{n\pi}{4} = \cos \frac{n\pi}{4} - \sqrt{2} \cos \frac{(n+1)\pi}{4}$

គុណអង្គទាំងពីរនឹង $(\sqrt{2})^n$

គេបាន $(\sqrt{2})^n \sin \frac{n\pi}{4} = (\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4} - (\sqrt{2})^{n+1} \cos \frac{(n+1)\pi}{4}$

ដូច្នេះនេះ: $\boxed{U_n = (\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4} - (\sqrt{2})^{n+1} \cos \frac{(n+1)\pi}{4}}$ ។

គ-គណនាផលបូក $S_n = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n$

យើងបាន

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left[(\sqrt{2})^k \cos \frac{k\pi}{4} - (\sqrt{2})^{k+1} \cos \frac{(k+1)\pi}{4} \right]$$

$$= \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} - (\sqrt{2})^{n+1} \cos \frac{(n+1)\pi}{4}$$

ដូចនេះ:

$$S_n = 1 - (\sqrt{2})^{n+1} \cos \frac{(n+1)\pi}{4}$$
 ។

លំហាត់ទី៦០

គេមានអនុគមន៍លេខ f កំនត់ពីសំណុំ \mathbb{N} ទៅសំណុំ \mathbb{R}

ដោយ $f(0) = 0$ និង $f(n+1) = 2f(n) + \tan \frac{\pi}{2^{n+2}}$

ចូរកំនត់រក $f(n)$?

ដំណោះស្រាយ

កំនត់រក $f(n)$

គេមាន $f(n+1) = 2f(n) + t \quad a \frac{\pi}{2^{n+2}}$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 2^n គេបាន

$$\frac{1}{2^n} f(n+1) = \frac{1}{2^{n-1}} f(n) + \frac{1}{2^n} t \quad \frac{\pi}{2^{n+2}} \quad (1)$$

គេមាន $t \quad 2a \quad a \frac{2t}{1-t} \quad a \quad a \quad \frac{2t n a}{ac} \quad a \quad = \frac{n2}{o^2 ana c} \quad at-t \quad na$

គេទាញ $t \quad a = c na \ominus 2c t \quad 2a$ ដោយយក $a = \frac{\pi}{2^{n+2}}$

គេបាន $t \frac{\pi}{2^{n+2}} = \cot \frac{\pi}{2^{n+2}} - 2ct \frac{\pi}{2^{n+1}} \quad (2)$

យក (២) ជួសក្នុង (១) គេបាន

$$\frac{1}{2^n} f(n+1) - \frac{1}{2^{n-1}} f(n) = \frac{1}{2^n} c \frac{\pi}{2^{n+2}} - \frac{1}{2^{n-1}} c \frac{\pi}{2^{n+1}}$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{1}{2^k} f(k+1) - \frac{1}{2^{k-1}} f(k) \right] = \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{1}{2^k} c \frac{\pi}{2^{k+2}} - \frac{1}{2^{k-1}} c \frac{\pi}{2^{k+1}} \right]$$

$$\frac{1}{2^{n-1}} f(n) - 2f(0) = \frac{1}{2^{n-1}} c \frac{\pi}{2^{n+1}} \Rightarrow f(n) = \cot \frac{\pi}{2^{n+1}}$$

ដូច្នេះ: $f(n) = \cot \frac{\pi}{2^{n+1}} \quad \square$

លំហាត់ទី៦១

គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (U_n) កំណត់លើ n ដោយ៖

$$U_0 = 1 \quad \text{និង} \quad \forall n \in \mathbb{N} : U_{n+1} = U_n \cos a + \sin a$$

$$\text{ដែល } 0 < a < \frac{\pi}{2} \quad \text{។}$$

ក. តាង $V_n = U_n - \cot \frac{a}{2}$ ។ បង្ហាញថា (V_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ។

ខ. គណនាលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} (V_0 + V_1 + \dots + V_n)$ និង $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. បង្ហាញថា (V_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយ៖

$$\text{មាន } V_n = U_n - \cot \frac{a}{2} \quad \text{នាំឲ្យ } V_{n+1} = U_{n+1} - \cot \frac{a}{2}$$

$$\text{តែ } U_{n+1} = U_n \cos a + \sin a$$

$$\text{គេបាន } V_{n+1} = U_n \cos a + \sin a - \cot \frac{a}{2}$$

$$\begin{aligned}
 &= U_n \cos a + 2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2} - \cot \frac{a}{2} \\
 &= U_n \cos a + \cot \frac{a}{2} (2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2} \tan \frac{a}{2} - 1) \\
 &= U_n \cos a + \cot \frac{a}{2} (2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2} \frac{\sin \frac{a}{2}}{\cos \frac{a}{2}} - 1) \\
 &= U_n \cos a + \cot \frac{a}{2} (2 \sin^2 \frac{a}{2} - 1) \quad ; \quad \cos a = 1 - 2 \sin^2 \frac{a}{2} \\
 &= U_n \cos a - \cot \frac{a}{2} \cos a = (U_n - \cot \frac{a}{2}) \cos a \\
 &= V_n \cos a
 \end{aligned}$$

ដោយ $V_{n+1} = V_n \cos a$ នាំឱ្យ (V_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

មួយមានរេស៊ីដង $\cos a$ និង តួ $V_0 = U_0 - \cot \frac{a}{2} = 1 - \cot \frac{a}{2}$ ។

ខ. គណនាលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} (V_0 + V_1 + \dots + V_n)$ និង $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

យើងមាន ៖

$$V_0 + V_1 + \dots + V_n = V_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = (1 - \cot \frac{a}{2}) \cdot \frac{1 - \cos^{n+1} a}{1 - \cos a}$$

យើងបាន ៖

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (V_0 + V_1 + \dots + V_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[(1 - \cot \frac{a}{2}) \frac{1 - \cos^{n+1} a}{1 - \cos a} \right]$$

ដោយ $0 < a < \frac{\pi}{2}$ នោះ $0 < \cos a < 1$ និង $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos^{n+1} a = 0$

ដូចនេះ:
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (V_0 + V_1 + \dots + V_n) = \frac{1 - \cot \frac{a}{2}}{1 - \cos a} \quad \text{។}$$

ម៉្យាងទៀត $V_n = U_n - \cot \frac{a}{2}$ នាំឱ្យ $U_n = V_n + \cot \frac{a}{2}$

ដោយ $V_n = V_0 \times q^n = (1 - \cot \frac{a}{2}) \cos^n a$

គេបាន $U_n = (1 - \cot \frac{a}{2}) \cos^n a + \cot \frac{a}{2}$

និង $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[(1 - \cot \frac{a}{2}) \cos^n a + \cot \frac{a}{2} \right] = \cot \frac{a}{2}$

ព្រោះ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos^n a = 0$ ។

ដូចនេះ: $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \cot \frac{a}{2}$ ។

លំហាត់ទី៦២

គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនកុំផ្លិច (Z_n) កំណត់ដោយ ៖

$$\begin{cases} Z_0 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} \\ Z_{n+1} = \frac{1}{2}(Z_n + |Z_n|); n \in \mathbb{IN} \end{cases} \quad (|Z_n| \text{ ជាម៉ូឌុលនៃ } Z_n)$$

សន្មតថា $Z_n = \rho_n (\cos \theta_n + i \sin \theta_n)$, $\forall n \in \mathbb{IN}$

ដែល $\rho_n > 0$, $\rho_n ; \theta_n \in \mathbb{IR}$ ។

ក-ចូររកទំនាក់ទំនងរវាង θ_n និង θ_{n+1} ហើយ ρ_n និង ρ_{n+1} ។

ខ-រកប្រភេទនៃស្វ៊ីត (θ_n) រួចគណនា θ_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

គ-ចូរបង្ហាញថា $\rho_n = \rho_0 \cos \theta_0 \cos \frac{\theta_1}{2} \cos \frac{\theta_2}{2} \dots \cos \frac{\theta_{n-1}}{2}$

រួចបញ្ជាក់ ρ_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

ដំណោះស្រាយ

ក-រកទំនាក់ទំនងរវាង θ_n និង θ_{n+1} ហើយ ρ_n និង ρ_{n+1}

យើងមាន $Z_n = \rho_n(\cos \theta_n + i \sin \theta_n)$

នាំឱ្យ $Z_{n+1} = \rho_{n+1}(\cos \theta_{n+1} + i \sin \theta_{n+1})$

ដោយ $Z_{n+1} = \frac{1}{2}(Z_n + |Z_n|)$ ហើយ $|Z_n| = \rho_n$

គេបាន ៖

$$\rho_{n+1}(\cos \theta_{n+1} + i \sin \theta_{n+1}) = \frac{1}{2}[\rho_n(\cos \theta_n + i \sin \theta_n) + \rho_n]$$

$$\rho_{n+1}(\cos \theta_{n+1} + i \sin \theta_{n+1}) = \frac{1}{2}\rho_n(1 + \cos \theta_n + i \sin \theta_n)$$

$$\rho_{n+1}(\cos \theta_{n+1} + i \sin \theta_{n+1}) = \rho_n \cos \frac{\theta_n}{2}(\cos \frac{\theta_n}{2} + i \sin \frac{\theta_n}{2})$$

គេទាញបាន $\rho_{n+1} = \rho_n \cos \frac{\theta_n}{2}$ និង $\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}$

ដូចនេះ $\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}$ និង $\rho_{n+1} = \rho_n \cos \frac{\theta_n}{2}$ ។

ខ-ប្រភេទនៃស្វ៊ីត (θ_n) និង គណនា θ_n ជាអនុគមន៍នៃ n ៖

តាមសម្រាយខាងលើយើងមាន $\theta_{n+1} = \frac{1}{2} \theta_n$

នាំឲ្យ (θ_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមានស្រដៀងស្មើ $q = \frac{1}{2}$ ។

តាមរូបមន្ត $\theta_n = \theta_0 \times q^n$

ដោយ $Z_0 = \rho_0(\cos \theta_0 + i \sin \theta_0) = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$

គេទាញបាន $\rho_0 = 1$; $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ ដូចនេះ: $\theta_n = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{2^n}$ ។

គ-បង្ហាញថា $\rho_n = \rho_0 \cos \theta_0 \cos \frac{\theta_1}{2} \cos \frac{\theta_2}{2} \dots \cos \frac{\theta_n}{2}$

តាមសម្រាយខាងលើគេមាន $\rho_{n+1} = \rho_n \cos \frac{\theta_n}{2}$ ឬ $\frac{\rho_{n+1}}{\rho_n} = \cos \frac{\theta_n}{2}$

គេបាន $\prod_{k=0}^{n-1} \left(\frac{\rho_{k+1}}{\rho_k} \right) = \prod_{k=0}^{n-1} \left[\cos \left(\frac{\theta_k}{2} \right) \right]$

$$\frac{\rho_n}{\rho_0} = \cos \theta_0 \cdot \cos \frac{\theta_1}{2} \cdot \cos \frac{\theta_2}{2} \dots \cos \frac{\theta_{n-1}}{2}$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ដូច្នេះនេះ $\rho_n = \rho_0 \cos \theta_0 \cos \frac{\theta_1}{2} \cos \frac{\theta_2}{2} \dots \cos \frac{\theta_{n-1}}{2}$ ។

ម៉្យាងទៀតយើងមាន $\sin \theta_n = 2 \sin \frac{\theta_n}{2} \cos \frac{\theta_n}{2} = 2 \sin \theta_{n+1} \cos \frac{\theta_n}{2}$

(ព្រោះ $\theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}$) តែទាញ $\cos \frac{\theta_n}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \theta_n}{\sin \theta_{n+1}}$

ហេតុនេះ $\rho_n = \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\sin \theta_0}{\sin \theta_1} \cdot \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \dots \frac{\sin \theta_{n-1}}{\sin \theta_n} = \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\sin \theta_0}{\sin \theta_n}$

ដូច្នេះនេះ $\rho_n = \frac{1}{2^n} \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\sin(\frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{2^n})} = \frac{\sqrt{3}}{2^{n+1}} \cdot \frac{1}{\sin(\frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{2^n})}$ ។

លំហាត់ទី៦៣

គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (U_n) កំនត់លើ $\mathbb{N} \cup \{0\}$ ដោយ ៖

$$\begin{cases} U_0 = \sqrt{2} \\ U_{n+1} = \sqrt{2 + U_n} \quad , n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

ក. ចូរគណនា U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

ខ. គណនាផលគុណ $P_n = U_0 \times U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$ ។

ដំណោះស្រាយ

គណនា U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ៖

យើងមាន

$$U_0 = \sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{4} \quad \text{និង} \quad U_1 = \sqrt{2 + U_0} = \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{4}} = 2 \cos \frac{\pi}{8}$$

$$\text{ឧបមាថាវាពិតដល់តួទី } p \quad \text{គឺ} \quad U_p = 2 \cos \frac{\pi}{2^{p+2}}$$

$$\text{យើងនឹងស្រាយថាវាពិតដល់តួទី } (p+1) \quad \text{គឺ} \quad U_{p+1} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{p+3}}$$

យើងមាន $U_{p+1} = \sqrt{2 + U_p}$ តែតាមការឧបមា $U_p = 2 \cos \frac{\pi}{2^{p+2}}$

យើងបាន $U_{p+1} = \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{2^{p+2}}} = \sqrt{4 \cos^2 \frac{\pi}{2^{p+3}}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{p+3}}$ ពិត

ដូចនេះ:
$$U_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+2}} \quad \text{។}$$

ខ. គណនាផលគុណ $P_n = U_0 \times U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$

តាមរូបមន្ត $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$ នាំឱ្យ $2 \cos a = \frac{\sin 2a}{\sin a}$

$$P_n = \prod_{k=0}^n (U_k) = \prod_{k=0}^n (2 \cos \frac{\pi}{2^{k+2}}) = \prod_{k=0}^n \left(\frac{\sin \frac{\pi}{2^{k+1}}}{\sin \frac{\pi}{2^{k+2}}} \right) = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\sin \frac{\pi}{2^{n+2}}} = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2^{n+2}}}$$

ដូចនេះ:
$$P_n = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2^{n+2}}} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៦៤

គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (U_n) កំណត់ដោយ ៖

$$U_0 = 0 ; U_1 = 1 \quad \text{និង} \quad \forall n \in \mathbb{N} : U_{n+2} = 2U_{n+1} \cos a - U_n$$

ដែល $a \in \mathbb{R}$ ។

ក. តាង $Z_n = U_{n+1} - (\cos a - i \sin a) U_n$, $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ។

ចូរបង្ហាញថា $Z_{n+1} = (\cos a + i \sin a) Z_n$ រួចទាញរក Z_n ជាអនុគមន៍នៃ n និង a ។

ខ. ទាញរក U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

ដំណោះស្រាយ

ក. បង្ហាញថា $Z_{n+1} = (\cos a + i \sin a) Z_n$

យើងមាន $Z_n = U_{n+1} - (\cos a - i \sin a) U_n$

យើងបាន $Z_{n+1} = U_{n+2} - (\cos a - i \sin a) U_{n+1}$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$\begin{aligned}
 &= 2U_{n+1} \cos a - U_n - (\cos a - i \sin a)U_{n+1} \\
 &= (\cos a + i \sin a)U_{n+1} - U_n \\
 &= (\cos a + i \sin a)\left(U_{n+1} - \frac{U_n}{\cos a + i \sin a}\right) \\
 &= (\cos a + i \sin a)\left[U_{n+1} - (\cos a - i \sin a)U_n\right] \\
 &= (\cos a + i \sin a) U_n
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $Z_{n+1} = (\cos a + i \sin a) Z_n$ ។

គណនា Z_n ជាអនុគមន៍នៃ n និង a ៖

ដោយ $Z_{n+1} = (\cos a + i \sin a) Z_n$ នាំឲ្យ (Z_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

នៃចំនួនកុំផ្លិចដែលមានរេស៊ីដង $q = \cos a + i \sin a$ និង

ត្រូវ $Z_0 = U_1 - (\cos a - i \sin a)U_0 = 1$ ។

តាមរូបមន្ត ៖

$$Z_n = Z_0 \times q^n = (\cos a + i \sin a)^n = \cos(na) + i \sin(na)$$

ដូចនេះ: $Z_n = \cos(na) + i \sin(na)$ ។

ខ. ទាញរក U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ៖

$$\text{យើងមាន } Z_n = U_{n+1} - (\cos a - i \sin a)U_n \quad (1)$$

$$\text{និង } \bar{Z}_n = U_{n+1} - (\cos a + i \sin a)U_n \quad (2)$$

ដកសមីការ (1) និង (2) អង្កនឹងអង្កគេបាន ៖

$$Z_n - \bar{Z}_n = 2i \sin a U_n \quad \text{នាំឲ្យ } U_n = \frac{Z_n - \bar{Z}_n}{2i \sin a} \quad \text{ដែល } \sin a \neq 0$$

$$\text{ដោយ } Z_n = \cos(na) + i \sin(na) \quad \text{និង } \bar{Z}_n = \cos(na) - i \sin(na)$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{U_n = \frac{\sin(na)}{\sin a}} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៦៥

គណនាផលបូកខាងក្រោម

$$S_n = \frac{t \frac{\pi}{8} + n \frac{\pi}{1} + \frac{nt}{6} \frac{\pi}{3} + \dots + \frac{t \frac{\pi}{2^{n+2}}}{c \frac{\pi}{4}}{c \frac{\pi}{8}} \frac{c \frac{\pi}{1}}{s \frac{\pi}{6}} \dots + \frac{t \frac{\pi}{2^{n+2}}}{c \frac{\pi}{2^{n+1}}}$$

រួចទាញរកលីមីតនៃ S_n កាលណា $n \rightarrow +\infty$ ។

ដំណោះស្រាយ

តាមរូបមន្ត $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$

គេបាន $\tan 2x - \tan x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} - \tan x = \frac{\tan x + \tan^2 x}{1 - \tan^2 x}$

$$\tan 2x - \tan x = \tan x \cdot \frac{1 + \tan^2 x}{1 - \tan^2 x}$$

ដោយ $c \quad \alpha x = \frac{1 - t \quad a^2 x}{1 + t \quad a^2 x}$

នោះ $\tan 2x - \tan x = \frac{\tan x}{\cos 2x} (*)$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ដោយជ្រើសរើស $x = \frac{\pi}{2^{k+2}}$ ជួសក្នុង (*)

$$\text{គេបាន } \tan \frac{\pi}{2^{k+1}} - \tan \frac{\pi}{2^{k+2}} = \frac{\tan \frac{\pi}{2^{k+2}}}{\cos \frac{\pi}{2^{k+1}}}$$

$$\text{យើងបាន } S_n = \sum_{k=1}^n \left(t \frac{a^{\frac{\pi}{2^{k+1}}} - nt \frac{a^{\frac{\pi}{2^{k+2}}}}{2} \right)$$

$$= \left(t \frac{\pi}{4} - a \frac{\pi}{8} \right) + \left(n t \frac{\pi}{8} - a \frac{\pi}{1} \right) + \dots + \left(t \frac{\pi}{2^{n+1}} a - t \frac{na^{\frac{\pi}{2^{n+2}}}}{2} \right)$$

$$= t \frac{\pi}{4} - t \frac{na^{\frac{\pi}{2^{n+2}}}}{2} = 1 - t \frac{a^{\frac{\pi}{2^{n+2}}}}{2} n$$

$$\text{ដូចនេះ: } S_n = 1 - t \frac{a^{\frac{\pi}{2^{n+2}}}}{2} n \quad \text{។}$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀតគេមាន } \lim_{n \rightarrow +\infty} t \frac{a^{\frac{\pi}{2^{n+2}}}}{2} n = 0$$

$$\text{ដូចនេះ: } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1 \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៦៦

គេឲ្យ (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តមួយមានផលសង្ស័យ d ។

$$\text{គេតាង } S_n = \frac{\cos a_1}{\cos d} + \frac{\cos a_2}{\cos^2 d} + \frac{\cos a_3}{\cos^3 d} + \dots + \frac{\cos a_n}{\cos^n d}$$

ចំពោះ $n = 1, 2, 3, \dots$ ។

$$\text{ចូរស្រាយថា } S_n = \frac{\sin a_n}{\cos^n d \sin d} - \frac{\sin a_1}{\sin d}$$

ដំណោះស្រាយ

$$\text{ស្រាយថា } S_n = \frac{\sin a_n}{\cos^n d \sin d} - \frac{\sin a_1}{\sin d}$$

ដោយ (a_n) ជាស្វ៊ីតនព្វន្តមួយមានផលសង្ស័យ d នោះ

$$a_{n+1} = a_n + d \quad \text{។}$$

$$\text{គេបាន } \sin a_{n+1} = \sin(a_n + d) = \sin a_n \cos d + \sin d \cos a_n$$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង $\cos^{n+1} d \neq 0$ គេបាន ៖

$$\frac{\sin a_{n+1}}{\cos^{n+1} d} = \frac{\sin a_n \cos d + \sin d \cos a_n}{\cos^{n+1} d}$$

$$\text{គេទាញ } \frac{\cos a_n}{\cos^n d} = \frac{\cos d}{\sin d} \left(\frac{\sin a_{n+1}}{\cos^{n+1} d} - \frac{\sin a_n}{\cos^n d} \right)$$

$$S_n = \sum_{p=1}^n \left[\frac{\cos d}{\sin d} \left(\frac{\sin a_{p+1}}{\cos^{p+1} d} - \frac{\sin a_p}{\cos^p d} \right) \right]$$

$$S_n = \frac{\cos d}{\sin d} \left(\frac{\sin a_{n+1}}{\cos^{n+1} d} - \frac{\sin a_1}{\cos d} \right) = \frac{\sin a_{n+1}}{\cos^n d \sin d} - \frac{\sin a_1}{\sin d}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } S_n = \frac{\sin a_n}{\cos^n d \sin d} - \frac{\sin a_1}{\sin d} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៦៧

ក. ចូរបង្ហាញថា

$$\frac{1}{2 + \sin(2n - 1)x} - \frac{1}{2 + \sin(2n + 1)x} = \frac{2 \sin x \cos(2nx)}{[2 + \sin(2n - 1)x][2 + \sin(2n + 1)x]}$$

ខ. គណនា $S_n = \sum_{k=1}^n \left[\frac{\cos(2kx)}{(2 + \sin(2k - 1)x)(2 + \sin(2k + 1)x)} \right]$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. ការបង្ហាញ

តាង $f(x) = \frac{1}{2 + \sin(2n - 1)x} - \frac{1}{2 + \sin(2n + 1)x}$

$$= \frac{\sin(2n + 1)x - \sin(2n - 1)x}{(2 + \sin(2n - 1)x)(2 + \sin(2n + 1)x)}$$

$$= \frac{2 \sin x \cos(2nx)}{(2 + \sin(2n - 1)x)(2 + \sin(2n + 1)x)} \quad \text{ពី ក}$$

$$\text{ខ. គណនា } S_n = \sum_{k=1}^n \left[\frac{\cos(2kx)}{(2 + \sin(2k - 1)x)(2 + \sin(2k + 1)x)} \right]$$

$$\text{យើងបាន } S_n = \frac{1}{2\sin x} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{2 + \sin(2n - 1)x} - \frac{1}{2 + \sin(2n + 1)x} \right]$$

$$= \frac{1}{2\sin x} \left[\frac{1}{2 + \sin x} - \frac{1}{2 + \sin(2n + 1)x} \right]$$

$$= \frac{1}{2\sin x} \cdot \frac{\sin(2n + 1)x - \sin x}{(2 + \sin x)(2 + \sin(2n + 1)x)}$$

$$= \frac{\sin(nx) \cos(n + 1)x}{\sin x (2 + \sin x)(2 + \sin(2n + 1)x)}$$

$$\text{ដូចនេះ: } S_n = \frac{\sin(nx) \cos(n + 1)x}{\sin x (2 + \sin x)(2 + \sin(2n + 1)x)} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៦៨

ក. ចូរស្រាយថា

$$\cos(2nx) = \frac{1}{2\sin x} [\sin(2n+1)x - \sin(2n-1)x]$$

ខ. គណនាផលបូក

$$S_n = \cos 2x + \cos 4x + \cos 6x + \dots + \cos(2nx)$$

គ. ទាញរកផលបូក

$$T_n = \cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x + \dots + \cos^2(nx)$$

ឃ. គណនាផលបូក

$$U_n = \sin^2 x + \sin^2 2x + \sin^2 3x + \dots + \sin^2(nx)$$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា $\cos(2nx) = \frac{1}{2\sin x} [\sin(2n+1)x - \sin(2n-1)x]$

តាមរូបមន្ត $\sin p - \sin q = 2\sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$

ដោយយក $p = (2n + 1)x$, $q = (2n - 1)x$

និង $p - q = 2x$, $p + q = 4nx$

គេបាន $\sin(2n + 1)x - \sin(2n - 1)x = 2\sin x \cos(2nx)$

ដូច្នេះ $\cos(2nx) = \frac{1}{2\sin x} [\sin(2n + 1)x - \sin(2n - 1)x]$ ។

ខ. គណនាផលបូក $S_n = \cos 2x + \cos 4x + \cos 6x + \dots + \cos(2nx)$

យើងបាន $S_n = \sum_{k=1}^n [\cos(2kx)]$

$$= \frac{1}{2\sin x} \sum_{k=1}^n [\sin(2k + 1)x - \sin(2k - 1)x]$$

$$= \frac{1}{2\sin x} [\sin(2n + 1)x - \sin x]$$

$$= \frac{1}{2\sin x} [2\sin(nx) \cos(n + 1)x] = \frac{\sin(nx) \cos(n + 1)x}{\sin x}$$

ដូច្នេះ $S_n = \frac{\sin(nx) \cos(n + 1)x}{\sin x}$ ។

គ. ទាញរកផលបូក $T_n = \cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x + \dots + \cos^2(nx)$

យើងបាន $T_n = \sum_{k=1}^n [\cos^2(kx)]$ តាមរូបមន្ត $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$

គេបាន $T_n = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1 + \cos(2kx)}{2} \right] = \frac{n}{2} + \frac{1}{2} S_n$

ដោយ $S_n = \frac{\sin(nx) \cos(n+1)x}{\sin x}$

ដូចនេះ $T_n = \frac{n}{2} + \frac{\sin(nx) \cos(n+1)x}{2 \sin x}$ ។

ឃ. គណនាផលបូក

$U_n = \sin^2 x + \sin^2 2x + \sin^2 3x + \dots + \sin^2(nx)$

យើងបាន $U_n = \sum_{k=1}^n [\sin^2(kx)] = \sum_{k=1}^n [1 - \cos^2(kx)] = n - T_n$

ដោយ $T_n = \frac{n}{2} + \frac{\sin(nx) \cos(n+1)x}{2 \sin x}$

ដូចនេះ $U_n = \frac{n}{2} - \frac{\sin(nx) \cos(n+1)x}{2 \sin x}$ ។

លំហាត់ទី៦៩

ក. ចូរស្រាយថា
$$\frac{\tan^3 x}{1 - \tan^2 x} = \frac{1}{2} \tan 2x - \tan x$$

ខ. ចូរគណនាផលបូក
$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{2^k \tan^3 \frac{a}{2^k}}{1 - \tan^2 \frac{a}{2^k}} \right)$$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា
$$\frac{\tan^3 x}{1 - \tan^2 x} = \frac{1}{2} \tan 2x - \tan x$$

យើងបាន
$$\frac{1}{2} \tan 2x - \tan x = \frac{\tan x}{1 - \tan^2 x} - \tan x = \frac{\tan^3 x}{1 - \tan^2 x}$$

ដូច្នេះ
$$\frac{\tan^3 x}{1 - \tan^2 x} = \frac{1}{2} \tan 2x - \tan x \quad \sphericalcap$$

ខ.គណនាផលបូក $S_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{2^k \tan^3 \frac{a}{2^k}}{1 - \tan^2 \frac{a}{2^k}} \right)$

គេមាន $\frac{\tan^3 x}{1 - \tan^2 x} = \frac{1}{2} \tan 2x - \tan x$ យក $x = \frac{a}{2^k}$

គេបាន $\frac{\tan^3 \frac{a}{2^k}}{1 - \tan^2 \frac{a}{2^k}} = \frac{1}{2} \tan \frac{a}{2^{k-1}} - \tan \frac{a}{2^k}$

យើងបាន៖

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(2^{k-1} \tan \frac{a}{2^{k-1}} - 2^k \tan \frac{a}{2^k} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \tan 2a - 2^n \tan \frac{a}{2^n}$$

ដូច្នេះ $S_n = \frac{1}{2} \tan 2a - 2^n \tan \frac{a}{2^n}$ ។

លំហាត់ទី៧០

ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនង $\tan x = \cot x - 2 \cot 2x$

ខ. ចូរគណនាផលបូកខាងក្រោម ៖

$$S_n = \tan a + \frac{1}{2} \tan \frac{a}{2} + \frac{1}{2^2} \tan \frac{a}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} \tan \frac{a}{2^n}$$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនង $\tan x = \cot x - 2 \cot 2x$

តាំង $A = \cot x - 2 \cot 2x$

ដោយ $\left\{ \begin{array}{l} \cot x = \frac{1}{\tan x} \\ \cot 2x = \frac{1}{\tan 2x} = \frac{1 - \tan^2 x}{2 \tan x} \end{array} \right.$

គេបាន

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{\tan x} - 2 \left(\frac{1 - \tan^2 x}{2 \tan x} \right) \\ &= \frac{1 - 1 + \tan^2 x}{\tan x} = \tan x \end{aligned}$$

ដូច្នេះ: $\tan x = \cot x - 2 \cot 2x$ ។

ខ. គណនាផលបូកខាងក្រោម ៖

$$\begin{aligned} S_n &= \tan a + \frac{1}{2} \tan \frac{a}{2} + \frac{1}{2^2} \tan \frac{a}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} \tan \frac{a}{2^n} \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2^k} \tan \frac{a}{2^k} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \left[\frac{1}{2^k} \left(\cot \frac{a}{2^k} - 2 \cot \frac{a}{2^{k-1}} \right) \right] \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2^k} \cot \frac{a}{2^k} - \frac{1}{2^{k-1}} \cot \frac{a}{2^{k-1}} \right) = \frac{1}{2^n} \cot \frac{a}{2^n} - 2 \cot 2a \end{aligned}$$

ដូច្នេះ: $S_n = \tan a + \frac{1}{2} \tan \frac{a}{2} + \dots + \frac{1}{2^n} \tan \frac{a}{2^n} = \frac{1}{2^n} \cot \frac{a}{2^n} - 2 \cot 2a$

លំហាត់ទី៧១

គណនាផលគុណខាងក្រោម៖

$$P_n = \prod_{k=0}^n \left(\tan^{2^k} \frac{x}{2^k} \right) = \tan x \cdot \tan^2 \frac{x}{2} \cdot \tan^4 \frac{x}{4} \dots \tan^{2^n} \frac{x}{2^n}$$

ដំណោះស្រាយ

គណនាផលគុណ P_n ៖

$$\text{តើមាន } \tan a = \frac{\sin a}{\cos a} = \frac{2\sin^2 a}{2\sin a \cos a} = \frac{2\sin^2 a}{\sin 2a}$$

$$\text{យក } a = \frac{x}{2^k} \text{ តើបាន } \tan \frac{x}{2^k} = \frac{2\sin^2 \frac{x}{2^k}}{\sin \frac{2x}{2^k}}$$

$$\text{តើទាញ } P_n = \prod_{k=0}^n \left(2^{2^k} \cdot \frac{\sin^{2^{k+1}} \frac{x}{2^k}}{\sin^{2^k} \frac{2x}{2^k}} \right) = 2^{2^{n+1}-1} \cdot \frac{\sin^{2^{n+1}} \frac{x}{2^n}}{\sin 2x}$$

$$\text{ដូច្នេះ } P_n = 2^{(2^{n+1}-1)} \cdot \frac{\sin^{2^{n+1}} \frac{x}{2^n}}{\sin 2x} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៧២

គណនាផលគុណខាងក្រោម៖

$$P_n = \prod_{k=0}^n \left[\left(1 - \tan^2 \frac{x}{2^k} \right)^{2^k} \right]$$

ដំណោះស្រាយ

គណនាផលគុណ $P_n = \prod_{k=0}^n \left[\left(1 - \tan^2 \frac{x}{2^k} \right)^{2^k} \right]$

យើងមាន $1 - \tan^2 \frac{x}{2^k} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2^k} - \sin^2 \frac{x}{2^k}}{\cos^2 \frac{x}{2^k}} = \frac{\cos \frac{2x}{2^k}}{\cos^2 \frac{x}{2^k}}$

គេបាន $P_n = \prod_{k=0}^n \left[\frac{\cos^{2^k} \frac{x}{2^{k-1}}}{\cos^{2^{k+1}} \frac{x}{2^k}} \right] = \frac{\cos 2x}{\cos^{2^{n+1}} \frac{x}{2^n}}$

ដូចនេះ $P_n = \frac{\cos 2x}{\cos^{2^{n+1}} \frac{x}{2^n}}$ ។

លំហាត់ទី៧៣

គណនាផលគុណ៖

$$P_n = \prod_{k=1}^n \left[\frac{1 + \tan^2 2^k x}{(1 - \tan^2 2^k)^2} \right] \quad \text{ដែល } |x| < \frac{\pi}{2^{n+2}}$$

ដំណោះស្រាយ

តាមរូបមន្ត $\cos 2a = \frac{1 - \tan^2 a}{1 + \tan^2 a}$

គេបាន $\cos 2^{k+1} x = \frac{1 - \tan^2 2^k x}{1 + \tan^2 2^k x}$

ហើយ $1 - \tan^2 2^k = \frac{\cos^2 2^k - \sin^2 2^k}{\cos^2 2^k x} = \frac{\cos 2^{k+1} x}{\cos^2 2^k x}$

គេបាន $\frac{1 + \tan^2 2^k x}{(1 - \tan^2 2^k x)^2} = \frac{\cos^2 2^k x}{\cos^2 2^{k+1} x}$

ដូចនេះ $P_n = \prod_{k=1}^n \left(\frac{\cos^2 2^k x}{\cos^2 2^{k+1} x} \right) = \frac{\cos^2 2x}{\cos^2 2^{n+1} x} \quad \square$

លំហាត់ទី៧៤

ក. ចូរស្រាយថា $\frac{1}{\sin 2x} = \cot x - \cot 2x$

ខ. ចូរគណនា $S_n = \frac{1}{\sin a} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^2}} + \dots + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^n}}$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា $\frac{1}{\sin 2x} = \cot x - \cot 2x$

ពង $f(x) = \cot x - \cot 2x$

$$\begin{aligned} &= \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\cos 2x}{\sin 2x} \\ &= \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{2\cos^2 x - 1}{2\sin x \cos x} \\ &= \frac{2\cos^2 x - 2\cos^2 x + 1}{2\sin x \cos x} = \frac{1}{\sin 2x} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\frac{1}{\sin 2x} = \cot x - \cot 2x \quad \checkmark$

ខ.គណនា $S_n = \frac{1}{\sin a} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^2}} + \dots + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^n}}$

យើងបាន $S_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{\sin \frac{a}{2^k}} \right)$

ដោយ $\frac{1}{\sin 2x} = \cot x - \cot 2x$

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(\cot \frac{a}{2^{k+1}} - \cot \frac{a}{2^k} \right)$$

$$= \cot \frac{a}{2^{n+1}} - \cot a$$

ដូច្នេះ $S_n = \cot \frac{a}{2^{n+1}} - \cot a$ ។

លំហាត់ទី៧៥

ក. ចូរស្រាយថា $1 + \frac{1}{\cos x} = \frac{\cot \frac{x}{2}}{\cot x}$

ខ. គណនា $P_n = (1 + \frac{1}{\cos a})(1 + \frac{1}{\cos \frac{a}{2}})(1 + \frac{1}{\cos \frac{a}{2^2}}) \dots (1 + \frac{1}{\cos \frac{a}{2^n}})$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា $1 + \frac{1}{\cos x} = \frac{\cot \frac{x}{2}}{\cot x}$

យើងតាង $A(x) = 1 + \frac{1}{\cos x}$

$$= \frac{\cos x + 1}{\cos x} = \frac{2 \cos^2 \frac{x}{2}}{\cos x} = \frac{2 \cos^2 \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{\cos x \sin \frac{x}{2}} = \frac{\cos \frac{x}{2} \sin x}{\cos x \sin \frac{x}{2}}$$

$$= \frac{\cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \tan \frac{x}{2} \tan x = \frac{\cot \frac{x}{2}}{\cot x}$$

ដូចនេះ: $1 + \frac{1}{\cos x} = \frac{\cot \frac{x}{2}}{\cot x}$ ។

ខ. គណនាផលគុណ

$$P_n = \left(1 + \frac{1}{\cos a}\right) \left(1 + \frac{1}{\cos \frac{a}{2}}\right) \left(1 + \frac{1}{\cos \frac{a}{2^2}}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{\cos \frac{a}{2^n}}\right)$$

$$= \prod_{k=0}^n \left(1 + \frac{1}{\cos \frac{a}{2^k}}\right) = \prod_{k=0}^n \left[\frac{\cot \frac{a}{2^{k+1}}}{\cot \frac{a}{2^k}}\right]$$

ដូចនេះ: $P_n = \tan \frac{a}{2^{n+1}} \cdot \cot a$ ។

លំហាត់ទី៧៦

ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\tan 2x \cdot \tan^2 x = \tan 2x - 2 \tan x$

ខ. ចូរគណនាផលបូក $S_n = \sum_{k=0}^n \left[2^k \tan \frac{a}{2^k} \tan^2 \frac{a}{2^{k+1}} \right]$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\tan 2x \cdot \tan^2 x = \tan 2x - 2 \tan x$

តាង $f(x) = \tan 2x - 2 \tan x$ ដោយ $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$

$$\text{គេបាន } f(x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} - 2 \tan x$$

$$= \frac{2 \tan x - 2 \tan x(1 - \tan^2 x)}{1 - \tan^2 x}$$

$$= \frac{2 \tan x - 2 \tan x + 2 \tan^3 x}{1 - \tan^2 x}$$

$$= \frac{2 \tan^3 x}{1 - \tan^2 x} = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \cdot \tan^2 x = \tan 2x \cdot \tan^2 x$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \tan 2x \cdot \tan^2 x = \tan 2x - 2 \tan x \quad \checkmark$$

ខ. គណនាផលបូក $S_n = \sum_{k=0}^n \left[2^k \tan \frac{a}{2^k} \tan^2 \frac{a}{2^{k+1}} \right]$

យើងមាន $\tan 2x \cdot \tan^2 x = \tan 2x - 2 \tan x$

ដោយយក $x = \frac{a}{2^{k+1}}$

គេបាន $\tan \frac{a}{2^k} \tan^2 \frac{a}{2^{k+1}} = \tan \frac{a}{2^k} - 2 \tan \frac{a}{2^{k+1}}$

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(2^k \tan \frac{a}{2^k} - 2^{k+1} \tan \frac{a}{2^{k+1}} \right) = \tan a - 2^{n+1} \tan \frac{a}{2^{n+1}}$$

ដូចនេះ

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left[2^k \tan \frac{a}{2^k} \tan^2 \frac{a}{2^{k+1}} \right] = \tan a - 2^{n+1} \tan \frac{a}{2^{n+1}} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៧៧

ក. ចូរស្រាយថា $\sin^3 x = \frac{1}{4} (3 \sin x - \sin 3x)$

ខ. ចូរគណនា

$$S_n = \sin^3 \frac{a}{3} + 3 \sin^3 \frac{a}{3^2} + 3^2 \sin^3 \frac{a}{3^3} + \dots + 3^{n-1} \sin^3 \frac{a}{3^n}$$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា $\sin^3 x = \frac{1}{4} (3 \sin x - \sin 3x)$

យើងមាន $\sin 3x = \sin(x + 2x)$

តាមរូបមន្ត $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$

$$= \sin x \cos 2x + \sin 2x \cos x$$

$$= \sin x(1 - 2 \sin^2 x) + 2 \sin x \cos^2 x$$

$$= \sin x(1 - 2 \sin^2 x) + 2 \sin x(1 - \sin^2 x)$$

$$= \sin x - 2 \sin^3 x + 2 \sin x - 2 \sin^3 x$$

$$= 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

ដោយ $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$

ដូចនេះ $\sin^3 x = \frac{1}{4} (3\sin x - \sin 3x)$ ។

ខ. គណនា

$$S_n = \sin^3 \frac{a}{3} + 3\sin^3 \frac{a}{3^2} + 3^2 \sin^3 \frac{a}{3^3} + \dots + 3^{n-1} \sin^3 \frac{a}{3^n}$$

យើងបាន $S_n = \sum_{k=1}^n \left(3^{k-1} \sin^3 \frac{a}{3^k} \right)$

ដោយ $\sin^3 x = \frac{1}{4} (3\sin x - \sin 3x)$

$$S_n = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \left(3^k \sin \frac{a}{3^k} - 3^{k-1} \sin \frac{a}{3^{k-1}} \right) = \frac{1}{4} (3^n \sin \frac{a}{3^n} - \sin a)$$

លំហាត់ទី៧៨

ក. ចូរស្រាយថា $\frac{1}{\cos^2 x} = \frac{4}{\sin^2 2x} - \frac{1}{\sin^2 x}$

ខ. ចូរគណនា $S_n = \frac{1}{4\cos^2 \frac{a}{2}} + \frac{1}{4^2 \cos^2 \frac{a}{2^2}} + \dots + \frac{1}{4^n \cos^2 \frac{a}{2^n}}$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា $\frac{1}{\cos^2 x} = \frac{4}{\sin^2 2x} - \frac{1}{\sin^2 x}$

យើងមាន

$$\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} = \frac{4}{\sin^2 2x}$$

ដូច្នេះ: $\frac{1}{\cos^2 x} = \frac{4}{\sin^2 2x} - \frac{1}{\sin^2 x}$ ។

ខ. គណនាផលបូក៖

$$S_n = \frac{1}{4\cos^2 \frac{a}{2}} + \frac{1}{4^2 \cos^2 \frac{a}{2^2}} + \dots + \frac{1}{4^n \cos^2 \frac{a}{2^n}}$$

យើងបាន
$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{4^k} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{a}{2^k}} \right)$$

ដោយ
$$\frac{1}{\cos^2 x} = \frac{4}{\sin^2 2x} - \frac{1}{\sin^2 x}$$

គេបាន ៖

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{4^k} \left(\frac{4}{\sin^2 \frac{a}{2^{k-1}}} - \frac{1}{\sin^2 \frac{a}{2^k}} \right) \right]$$

$$= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{4^{k-1}} \cdot \frac{1}{\sin^2 \frac{a}{2^{k-1}}} - \frac{1}{4^k} \cdot \frac{1}{\sin^2 \frac{a}{2^k}} \right) = \frac{1}{\sin^2 a} - \frac{1}{4^n \sin^2 \frac{a}{2^n}}$$

ដូច្នេះ
$$S_n = \frac{1}{\sin^2 a} - \frac{1}{4^n \sin^2 \frac{a}{2^n}} \quad \square$$

លំហាត់ទី៧៩

ក. ចូរស្រាយថា $\frac{1}{\sin 2x} = \cot x - \cot 2x$

ខ. ចូរគណនា $S_n = \frac{1}{\sin a} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^2}} + \dots + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^n}}$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា $\frac{1}{\sin 2x} = \cot x - \cot 2x$

ពិធី $f(x) = \cot x - \cot 2x$

$$\begin{aligned} &= \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\cos 2x}{\sin 2x} \\ &= \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{2\cos^2 x - 1}{2\sin x \cos x} \\ &= \frac{2\cos^2 x - 2\cos^2 x + 1}{2\sin x \cos x} = \frac{1}{\sin 2x} \end{aligned}$$

ដូច្នេះ: $\frac{1}{\sin 2x} = \cot x - \cot 2x$ ។

ខ.គណនា $S_n = \frac{1}{\sin a} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2}} + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^2}} + \dots + \frac{1}{\sin \frac{a}{2^n}}$

យើងបាន $S_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{\sin \frac{a}{2^k}} \right)$ ដោយ $\frac{1}{\sin 2x} = \cot x - \cot 2x$

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(\cot \frac{a}{2^{k+1}} - \cot \frac{a}{2^k} \right)$$

$$= \cot \frac{a}{2^{n+1}} - \cot a$$

ដូច្នេះ: $S_n = \cot \frac{a}{2^{n+1}} - \cot a$ ។

លំហាត់ទី៨០

ក. ចូរស្រាយថា $\frac{\sin(nx)}{\cos^n x} = \left[\frac{\cos(n+1)x}{\cos^{n+1} x} - \frac{\cos(nx)}{\cos^n x} \right] \cdot \cot x$

ខ. ចូរគណនា $S_n = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin 2x}{\cos^2 x} + \frac{\sin 3x}{\cos^3 x} + \dots + \frac{\sin(nx)}{\cos^n x}$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា $\frac{\sin(nx)}{\cos^n x} = \left[\frac{\cos(n+1)x}{\cos^{n+1} x} - \frac{\cos(nx)}{\cos^n x} \right] \cdot \cot x$

យើងមាន $\cos(n+1)x = \cos(nx+x)$

ឬ $\cos(n+1)x = \cos(nx)\cos x - \sin(nx)\sin x$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង $\cos^{n+1} x$ គេបាន ៖

$$\frac{\cos(n+1)x}{\cos^{n+1} x} = \frac{\cos(nx)\cos x}{\cos^{n+1} x} - \frac{\sin(nx)\sin x}{\cos^{n+1} x} = \frac{\cos(nx)}{\cos^n x} - \frac{\sin(nx)}{\cos^n x} \cdot \tan x$$

នាំឲ្យ $\frac{\sin(nx)}{\cos^n x} = \left[\frac{\cos(n+1)x}{\cos^{n+1} x} - \frac{\cos(nx)}{\cos^n x} \right] \cdot \frac{1}{\tan x}$

ដូចនេះ $\frac{\sin(nx)}{\cos^n x} = \left[\frac{\cos(n+1)x}{\cos^{n+1} x} - \frac{\cos(nx)}{\cos^n x} \right] \cdot \cot x \quad \checkmark$

ខ. គណនា $S_n = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin 2x}{\cos^2 x} + \frac{\sin 3x}{\cos^3 x} + \dots + \frac{\sin(nx)}{\cos^n x}$

យើងបាន $S_n = \sum_{k=1}^n \left[\frac{\sin(kx)}{\cos^k x} \right]$

ដោយ $\frac{\sin(kx)}{\cos^k x} = \left[\frac{\cos(k+1)x}{\cos^{k+1} x} - \frac{\cos(kx)}{\cos^k x} \right] \cdot \cot x$

$$S_n = \cot x \sum_{k=1}^n \left(\frac{\cos(k+1)x}{\cos^{k+1} x} - \frac{\cos(kx)}{\cos^k x} \right) = \cot x \left(\frac{\cos(n+1)x}{\cos^{n+1} x} - 1 \right)$$

ដូច្នេះ $S_n = \frac{\cot x [\cos(n+1)x - \cos^{n+1} x]}{\cos^{n+1} x}$

លំហាត់ទី៨១

ក. ចូរបង្ហាញថា $1 + \tan x \tan(nx) = \frac{\cos(n-1)x}{\cos x \cos(nx)}$

ខ. គណនា $P_n = \prod_{k=1}^n [1 + \tan x \tan(kx)]$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. បង្ហាញថា $1 + \tan x \tan(nx) = \frac{\cos(n-1)x}{\cos x \cos(nx)}$

គេមាន $\cos(n-1)x = \cos(nx)\cos x + \sin(nx)\sin x$

នាំឱ្យ $\frac{\cos(n-1)x}{\cos x \cos(nx)} = \frac{\cos(nx)\cos x + \sin(nx)\sin x}{\cos(nx)\cos x}$
 $= 1 + \tan x \tan(nx)$ ពិត

ដូច្នេះ $1 + \tan x \tan(nx) = \frac{\cos(n-1)x}{\cos x \cos(nx)}$ ។

ខ. គណនា

$$\begin{aligned} \text{គេមាន } P_n &= \prod_{k=1}^n [1 + \tan x \tan(kx)] \\ &= \prod_{k=1}^n \left[\frac{\cos(k-1)x}{\cos x \cos(kx)} \right] \\ &= \frac{1}{\cos^n x} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\cos x}{\cos 2x} \cdot \frac{\cos 2x}{\cos 3x} \cdots \frac{\cos(n-1)x}{\cos(nx)} \\ &= \frac{1}{\cos^n x \cos(nx)} \\ P_n &= \frac{1}{\cos^n x \cos(nx)} \end{aligned}$$

លំហាត់ទី៨២

ក. ចូរស្រាយថា

$$\frac{1}{\cos(nx) \cdot \cos(n+1)x} = \frac{1}{\sin x} [\tan(n+1)x - \tan(nx)]$$

ខ. គណនាផលបូក $S_n = \sum_{p=1}^n \left[\frac{1}{\cos(px) \cos(p+1)x} \right]$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា $\frac{1}{\cos(nx) \cdot \cos(n+1)x} = \frac{1}{\sin x} [\tan(n+1)x - \tan(nx)]$

តាមរូបមន្ត $\tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$

នាំឲ្យ $\frac{1}{\cos p \cos q} = \frac{1}{\sin(p-q)} (\tan p - \tan q)$ (1)

យក $p = (n+1)x$, $q = (nx)$ និង $p - q = x$ ជួសក្នុង(1) គេបាន

$$\frac{1}{\cos(nx) \cdot \cos(n+1)x} = \frac{1}{\sin x} [\tan(n+1)x - \tan(nx)] \quad \text{ពិត ។}$$

ខ.គណនាផលបូក $S_n = \sum_{p=1}^n \left[\frac{1}{\cos(px) \cos(p+1)x} \right]$

តាមសម្រាយខាងលើគេមាន ៖

$$\frac{1}{\cos(px) \cdot \cos(p+1)x} = \frac{1}{\sin x} [\tan(p+1)x - \tan(px)]$$

យើងបាន $S_n = \frac{1}{\sin x} \sum_{p=1}^n [\tan(p+1)x - \tan(px)]$

$$= \frac{1}{\sin x} [\tan(n+1)x - \tan x]$$

$$= \frac{\sin(nx)}{\sin x \cos x \cos(n+1)x}$$

លំហាត់ទី៨៣

ក. ចូរស្រាយថា

$$\tan(n + 1)x - \tan(nx) = \tan x [1 + \tan(nx) \tan(n + 1)x]$$

ខ. គណនាផលបូក

$$S_n = \tan x \tan 2x + \tan 2x \tan 3x + \dots + \tan(nx) \tan(n + 1)x$$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា $\tan(n + 1)x - \tan(nx) = \tan x [1 + \tan(nx) \tan(n + 1)x]$

តាមរូបមន្ត $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$

នាំឱ្យ $\tan a - \tan b = \tan(a - b) (1 + \tan a \tan b)$ (1)

ដោយយក $a = (n + 1)x$, $b = nx$ នឹង $a - b = x$

ជួសក្នុង (1) គេបាន ៖

$$\tan(n + 1)x - \tan(nx) = \tan x [1 + \tan(nx) \tan(n + 1)x] \quad \text{។}$$

ខ. គណនាផលបូក

$$S_n = \tan x \tan 2x + \tan 2x \tan 3x + \dots + \tan(nx) \tan(n+1)x$$

យើងបាន
$$S_n = \sum_{k=1}^n [\tan(kx) \tan(k+1)x]$$

តាមសម្រាយខាងលើយើងមាន ៖

$$\tan(n+1)x - \tan(nx) = \tan x [1 + \tan(nx) \tan(n+1)x]$$

ឬ
$$\tan(nx) \tan(n+1)x = [\tan(n+1)x - \tan(nx)] \cot x - 1$$

យើងបាន
$$S_n = \sum_{k=1}^n [(\tan(k+1)x - \tan(kx)) \cot x - 1]$$

$$= [\tan(n+1)x - \tan x] \cot x - n$$

$$= \frac{\sin(nx)}{\cos(n+1)x \cos x} \cot x - n$$

ដូច្នេះ
$$S_n = \frac{\sin(nx)}{\cos(n+1)x \sin x} - n \quad \sphericalangle$$

លំហាត់ទី៨៤

ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $2\cos x - 1 = \frac{1 + 2\cos 2x}{1 + 2\cos x}$

ខ. ចូរគណនាផលគុណ ៖

$$P_n = (2\cos a - 1)(2\cos \frac{a}{2} - 1)(2\cos \frac{a}{2^2} - 1) \dots (2\cos \frac{a}{2^n} - 1)$$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $2\cos x - 1 = \frac{1 + 2\cos 2x}{1 + 2\cos x}$

តាមរូបមន្ត $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$

$$2\cos 2x = 4\cos^2 x - 2$$

$$2\cos 2x + 1 = 4\cos^2 x - 1$$

$$2\cos 2x + 1 = (2\cos x + 1)(2\cos x - 1)$$

ដូច្នេះ $2\cos x - 1 = \frac{1 + 2\cos 2x}{1 + 2\cos x}$ ។

ខ. គណនាផលគុណ ៖

$$P_n = (2 \cos a - 1)(2 \cos \frac{a}{2} - 1)(2 \cos \frac{a}{2^2} - 1) \dots (2 \cos \frac{a}{2^n} - 1)$$

$$= \prod_{k=0}^n \left(2 \cos \frac{a}{2^k} - 1 \right)$$

ដោយ $2 \cos x - 1 = \frac{1 + 2 \cos 2x}{1 + 2 \cos x}$

$$P_n = \prod_{k=0}^n \left[\frac{1 + 2 \cos \left(\frac{a}{2^{k-1}} \right)}{1 + 2 \cos \left(\frac{a}{2^k} \right)} \right] = \frac{1 + 2 \cos 2a}{1 + 2 \cos \frac{a}{2^n}}$$

ដូច្នេះ $P_n = \frac{1 + 2 \cos 2a}{1 + 2 \cos \frac{a}{2^n}} \quad \text{។}$

លំហាត់ទី៨៥

ក. ចូរស្រាយថា $\frac{\tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x} = \frac{1}{8} (\tan 3x - 3 \tan x)$

ខ. ចូរគណនាផលបូក $S_n = \sum_{k=0}^n \left[\frac{3^k \tan^3 \frac{a}{3^k}}{1 - 3 \tan^2 \frac{a}{3^k}} \right]$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា $\frac{\tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x} = \frac{1}{8} (\tan 3x - 3 \tan x)$

តាមរូបមន្ត $\tan 3x = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$

យើងបាន $\tan 3x - 3 \tan x = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x} - 3 \tan x = \frac{8 \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$

ដូចនេះ $\frac{\tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x} = \frac{1}{8} (\tan 3x - 3 \tan x) \quad \checkmark$

ខ. គណនាផលបូក $S_n = \sum_{k=0}^n \left[\frac{3^k \tan^3 \frac{a}{3^k}}{1 - 3 \tan^2 \frac{a}{3^k}} \right]$

យើងមាន $\frac{\tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x} = \frac{1}{8} (\tan 3x - 3 \tan x)$

ដោយយក $x = \frac{a}{3^k}$

គេបាន $\frac{\tan^3 \frac{a}{3^k}}{1 - 3 \tan^2 \frac{a}{3^k}} = \frac{1}{8} (\tan \frac{a}{3^{k-1}} - 3 \tan \frac{a}{3^k})$

យើងបាន

$$S_n = \frac{1}{8} \sum_{k=0}^n (3^k \tan \frac{a}{3^{k-1}} - 3^{k+1} \tan \frac{a}{3^k}) = \frac{1}{8} \left(\tan 3a - 3^{n+1} \tan \frac{a}{3^n} \right)$$

ដូច្នេះ $S_n = \frac{\tan 3a}{8} - \frac{3^{n+1}}{8} \tan \frac{a}{3^n}$ ។

លំហាត់ទី៨៦

គេឱ្យត្រីកោណ ABC មានជ្រុង a, b, c និងមានមុំក្នុង α, β, γ

បើ $\alpha = 3\beta$ ចូរបង្ហាញថា $(a - b)(a^2 - b^2) = bc^2$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយថា $(a - b)(a^2 - b^2) = bc^2$

តាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស៖

$$a = 2R \sin \alpha, \quad b = 2R \sin \beta, \quad c = 2R \sin \gamma$$

$$\text{គេបាន } (a - b)(a^2 - b^2) = (a - b)^2(a + b)$$

$$\text{ដោយ } a - b = 2R(\sin \alpha - \sin \beta)$$

$$= 2R(\sin 3\beta - \sin \beta)$$

$$= 4R \sin \beta \cos 2\beta$$

$$\text{ហើយ } a + b = 2R(\sin \alpha + \sin \beta)$$

$$= 2R(\sin 3\beta + \sin \beta)$$

$$= 4R \sin 2\beta \cos \beta$$

$$= 8R \sin \beta \cos^2 \beta$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$\text{គេបាន } (a - b)(a^2 - b^2) = 16R^2 \sin^2 \beta \cos^2 2\beta \cdot 8R \sin \beta \cos^2 \beta$$

$$= 8R^3 \sin^4 \beta \cos^2 \beta$$

$$= 8R^3 \sin^2(\pi - 4\beta) \cos^2 \beta$$

$$= 8R^3 \sin^2 \beta \cos^2 \beta$$

$$\text{ដូច្នេះ: } (a - b)(a^2 - b^2) = bc^2 \quad \square$$

លំហាត់ទី៨៧

គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយមាន a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងឈម

រៀងគ្នានៃមុំ A, B, C ។

តាង p ជាកន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ។

ក. ចូរស្រាយថា $\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}}$ រួចទាញរកទំនាក់ទំនង

ពីរទៀតដែលស្រដៀងគ្នានេះ ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $bc \cdot \cos^2 \frac{A}{2} + ac \cdot \cos^2 \frac{B}{2} + ab \cdot \cos^2 \frac{C}{2} = p^2$

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{1 + \cos A}{2}$

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុសអនុវត្តក្នុងត្រីកោណ ABC គេមាន

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad \text{គេទាញ} \quad \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

គេបាន $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{1 + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}}{2} = \frac{2bc + b^2 + c^2 - a^2}{4bc}$

$$\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{(b+c)^2 - a^2}{4bc} = \frac{(b+c+a)(b+c-a)}{4bc}$$

ដោយ $a+b+c = 2p$ នៅ: $b+c-a = 2(p-a)$

គេបាន $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{2p \cdot 2(p-a)}{4bc} = \frac{p(p-a)}{bc}$

ឬ $\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}}$ ពិត។

គេទាញបានទំនាក់ទំនងស្រដៀងគ្នានេះដូចខាងក្រោម ៖

$$\cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{p(p-b)}{ac}}, \quad \cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{p(p-c)}{ab}} \quad \text{។}$$

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា

$$bc \cdot \cos^2 \frac{A}{2} + ac \cdot \cos^2 \frac{B}{2} + ab \cdot \cos^2 \frac{C}{2} = p^2$$

តាមសម្រាយខាងលើគេមាន $\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}}$

$\cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{p(p-b)}{ac}}$, $\cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{p(p-c)}{ab}}$

គេទាញ $bc \cos^2 \frac{A}{2} = p(p-a) = p^2 - p \cdot a$

$ac \cos^2 \frac{B}{2} = p(p-b) = p^2 - p \cdot b$

$ab \cos^2 \frac{C}{2} = p(p-c) = p^2 - p \cdot c$

$bc \cdot \cos^2 \frac{A}{2} + ac \cdot \cos^2 \frac{B}{2} + ab \cdot \cos^2 \frac{C}{2} = 3p^2 - p(a+b+c)$
 $= 3p^2 - 2p^2 = p^2$

ដូច្នេះនេះ $bc \cdot \cos^2 \frac{A}{2} + ac \cdot \cos^2 \frac{B}{2} + ab \cdot \cos^2 \frac{C}{2} = p^2$ ។

លំហាត់ទី៨៨

គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយមានមុំក្នុងជាមុំស្រួច ។

ក. ចូរស្រាយថា $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$ ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយថា $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

យើងមាន $A + B + C = \pi$ ឬ $A + B = \pi - C$

គេបាន $\tan(A + B) = \tan(\pi - C)$

$$\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = -\tan C$$

$$\tan A + \tan B = -\tan C + \tan A \tan B \tan C$$

ដូច្នេះ $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$ ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$

ដោយ A, B, C ជាមុំស្រួច (តាមសម្មតិកម្ម)

គេទាញ $\tan A > 0, \tan B > 0, \tan C > 0$

តាមវិសមភាពកូស៊ីយ៉េងអាចសរសេរ ៖

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3 \sqrt[3]{\tan A \cdot \tan B \cdot \tan C}$$

$$\text{ដោយ } \tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$$

$$\text{គេបាន } \tan A + \tan B + \tan C \geq 3 \sqrt[3]{\tan A + \tan B + \tan C}$$

$$(\tan A + \tan B + \tan C)^3 \geq 27(\tan A + \tan B + \tan C)$$

$$(\tan A + \tan B + \tan C)^2 \geq 27$$

$$\text{ដូចនេះ } \tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3} \quad \text{។}$$

លំហាត់ទី៨៩

គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយមានមុំក្នុងជាមុំស្រួច ។

ចូរស្រាយថា $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C < 1$

ដំណោះស្រាយ

តាង $T = \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C$

$$= \frac{1 + \cos 2A}{2} + \frac{1 + \cos 2B}{2} + \cos^2 C$$

$$= 1 + \frac{\cos 2A + \cos 2B}{2} + \cos^2 C$$

$$= 1 + \cos(A + B)\cos(A - B) + \cos^2 C$$

$$= 1 + \cos(\pi - C)\cos(A - B) + \cos^2 C$$

$$= 1 - \cos C \cos(A - B) + \cos^2 C$$

$$= 1 - \cos C [\cos(A - B) - \cos C]$$

$$= 1 - \cos C [\cos(A - B) + \cos(A + B)] = 1 - 2\cos A \cos B \cos C$$

គេបាន $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2\cos A \cos B \cos C$

ដោយ A , B , C ជាមុំស្រួចនោះ $\cos A > 0$, $\cos B > 0$, $\cos C > 0$

ដូចនេះ $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C < 1$ ។

លំហាត់ទី៩០

គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយមានមុំក្នុងជាមុំស្រួច ។

ចូរស្រាយថា $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C > 2$ ។

ដំណោះស្រាយ

$$\text{ពិជ } T = \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$$

$$= \frac{1 - \cos 2A}{2} + \frac{1 - \cos 2B}{2} + 1 - \cos^2 C$$

$$= 2 - \frac{\cos 2A + \cos 2B}{2} - \cos^2 C$$

$$= 2 - \cos(A + B)\cos(A - B) - \cos^2 C$$

$$= 2 + \cos C \cos(A - B) - \cos C$$

$$= 2 + \cos C [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

$$= 2 + 2\cos A \cos B \cos C$$

ដោយ A , B , C ជាមុំស្រួចនោះ $\cos A > 0$, $\cos B > 0$, $\cos C > 0$

ដូច្នេះ $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C > 2$ ។

លំហាត់ទី៩១

គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយ ។

ក. ចូរស្រាយថា $\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$ ។

ខ. ចូរស្រាយថា $\cot^2 A - 1 = 2 \cot 2A \cot A$ ។

គ. គេដឹងថាមុំ A ; B ; C បង្កើតបានជាស្វីតធរណីមាត្រ

មួយដែលមានអសុដ្ឋស្មើនឹង $q = 2$ ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{1}{\sin^2 A} + \frac{1}{\sin^2 B} + \frac{1}{\sin^2 C} = 8$ ។

ដំណោះស្រាយ

ក.ស្រាយថា $\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$

យើងមាន $A + B + C = \pi$ ឬ $A + B = \pi - C$

គេបាន $\tan(A + B) = \tan(\pi - C)$

$$\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = -\tan C$$

$$\frac{\frac{1}{\cot A} + \frac{1}{\cot B}}{1 - \frac{1}{\cot A} \cdot \frac{1}{\cot B}} = -\frac{1}{\cot C}$$

$$\frac{\cot A + \cot B}{\cot A \cot B - 1} = -\frac{1}{\cot C}$$

$$\cot A \cot C + \cot B \cot C = -\cot A \cot B + 1$$

ដូច្នេះ: $\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$ ។

ខ.ស្រាយថា $\cot^2 A - 1 = 2 \cot 2A \cot A$

យើងមាន $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$

$$\frac{1}{\cot 2A} = \frac{\frac{2}{\cot A}}{1 - \frac{1}{\cot^2 A}} = \frac{2 \cot A}{\cot^2 A - 1}$$

ដូច្នេះ: $\cot^2 A - 1 = 2 \cot 2A \cot A$ ។

គ.ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\div \frac{1}{\sin^2 A} + \frac{1}{\sin^2 B} + \frac{1}{\sin^2 C} = 8$

តាង $T = \frac{1}{\sin^2 A} + \frac{1}{\sin^2 B} + \frac{1}{\sin^2 C}$

$$= (1 + \cot^2 A) + (1 + \cot^2 B) + (1 + \cot^2 C)$$

$$= (\cot^2 A - 1) + (\cot^2 B - 1) + (\cot^2 C - 1) + 6$$

$$= 2 \cot 2A \cot A + 2 \cot 2B \cot B + 2 \cot 2C \cot C + 6 \quad (1)$$

ដោយមុំ $A ; B ; C$ ជាស្វីតធរណីមាត្រមួយដែលមានរេសុង

ស្មើនឹង $q = 2$ គេបាន $B = 2A$, $C = 2B = 4A$

ដោយ $A + B + C = \pi$

គេបាន $A + 2A + 4A = \pi$ នាំឱ្យ $A = \frac{\pi}{7}$, $B = \frac{2\pi}{7}$, $C = \frac{4\pi}{7}$

តាម (1) គេបាន $T = 2 \cot \frac{2\pi}{7} \cot \frac{\pi}{7} + 2 \cot \frac{2\pi}{7} \cot \frac{4\pi}{7} + \cot \frac{8\pi}{7} \cot \frac{4\pi}{7} + 6$

ដោយ $\cot \frac{8\pi}{7} = \cot \frac{\pi}{7}$ គេបាន \div

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

$$\begin{aligned} T &= 2 \cot \frac{\pi}{7} \cot \frac{2\pi}{7} + 2 \cot \frac{2\pi}{7} \cot \frac{4\pi}{7} + 2 \cot \frac{\pi}{7} \cot \frac{4\pi}{7} + 6 \\ &= 2(\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot A \cot C) + 6 \\ &= 2(1) + 6 = 8 \end{aligned}$$

ដូច្នេះ: $\frac{1}{\sin^2 A} + \frac{1}{\sin^2 B} + \frac{1}{\sin^2 C} = 8$ ។

លំហាត់ទី៩២

រកតម្លៃអប្បបរមានៃអនុគមន៍ ៖

$$P(x) = \tan^2 x + \cot^2 x - 2(\tan x + \cot x) + 27$$

$$Q(x) = \tan^2 x + \cot^2 x - 8(\tan x + \cot x) + 87$$

$$\text{ដែល } 0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{។}$$

ដំណោះស្រាយ

រកតម្លៃអប្បបរមានៃអនុគមន៍ ៖

$$P(x) = \tan^2 x + \cot^2 x - 2(\tan x + \cot x) + 27$$

$$\text{ដែល } 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{តាង } z = \tan x + \cot x \quad \text{ដែល } z \geq 2$$

$$\text{គេបាន } z^2 = (\tan x + \cot x)^2 = \tan^2 x + \cot^2 x + 2$$

$$\text{គេទាញ } \tan^2 x + \cot^2 x = z^2 - 2$$

$$\text{យើងបាន } P(z) = z^2 - 2 - 2z + 27 = (z - 1)^2 + 24$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ដោយ $z \geq 2$ ហេតុនេះគេបាន $P(z) \geq 1 + 24 = 25$

ដូចនេះតម្លៃអប្បបរមានៃ $P(x)$ គឺ $m = 25$ ។

ម៉្យាងទៀតដោយ $Q(x) = \tan^2 x + \cot^2 x - 8(\tan x + \cot x) + 87$

គេបាន $Q(z) = z^2 - 2 - 8z + 87 = (z - 4)^2 + 69$

ដោយ $z \geq 2$ ហេតុនេះដើម្បីឲ្យ Q អប្បបរមាលុះត្រាតែ $z = 4$ ។

ដូចនេះតម្លៃអប្បបរមានៃ $Q(x)$ គឺ $m = 69$ ។

លំហាត់ទី៩៣

គេឲ្យត្រីកោណ ABC មួយ។

បង្ហាញថាបើ $\tan \frac{A}{3}, \tan \frac{B}{3}, \tan \frac{C}{3}$ ជាឫសរបស់សមីការ

$$(E) : x^3 + ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{នោះគេបាន } \sqrt{3} + a = \sqrt{3}b + c \quad ។$$

ដំណោះស្រាយ

យើងបាន $\tan\left(\frac{A}{3} + \frac{B}{3} + \frac{C}{3}\right) = \tan\left[\left(\frac{A}{3} + \frac{B}{3}\right) + \frac{C}{3}\right]$

$$\tan\left(\frac{A+B+C}{3}\right) = \frac{\tan\left(\frac{A}{3} + \frac{B}{3}\right) + \tan \frac{C}{3}}{1 - \tan\left(\frac{A}{3} + \frac{B}{3}\right) \tan \frac{C}{3}}$$

$$\tan \frac{\pi}{3} = \frac{\frac{\tan \frac{A}{3} + \tan \frac{B}{3}}{1 - \tan \frac{A}{3} \tan \frac{B}{3}} + \tan \frac{C}{3}}{1 - \frac{\tan \frac{A}{3} + \tan \frac{B}{3}}{1 - \tan \frac{A}{3} \tan \frac{B}{3}} \cdot \tan \frac{C}{3}}$$

$$\sqrt{3} = \frac{\tan \frac{A}{3} + \tan \frac{B}{3} + \tan \frac{C}{3} - \tan \frac{A}{3} \tan \frac{B}{3} \tan \frac{C}{3}}{1 - (\tan \frac{A}{3} \tan \frac{B}{3} + \tan \frac{A}{3} \tan \frac{C}{3} + \tan \frac{B}{3} \tan \frac{C}{3})} \quad (1)$$

ដោយ $\tan \frac{A}{3}$, $\tan \frac{B}{3}$, $\tan \frac{C}{3}$ ជាឫសរបស់សមីការ(E)

នោះតាមទ្រឹស្តីបទវ្យែតគេមានទំនាក់ទំនង ៖

$$\tan \frac{A}{3} + \tan \frac{B}{3} + \tan \frac{C}{3} = -a \quad (2)$$

$$\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} = b \quad (3)$$

$$\tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2} \cdot \tan \frac{C}{2} = -c \quad (4)$$

យកទំនាក់ទំនង (2) , (3) និង (4) ជួសក្នុងសមីការ (1)

គេបាន $\sqrt{3} = \frac{-a+c}{1-b}$ ឬ $\sqrt{3} - \sqrt{3} b = -a+c$ ពិត

លំហាត់ទី៩៤

គេឲ្យត្រីកោណ ABC ដែល $\sin \frac{A}{2} = \frac{a}{2\sqrt{bc}}$ ។

រកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ?

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $\sin \frac{A}{2} = \frac{a}{2\sqrt{bc}}$

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុសគេមាន $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

ដោយ $\cos A = 1 - 2\sin^2 \frac{A}{2}$ គេបាន ៖

$$\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = 1 - 2\frac{a^2}{4bc}$$

$$\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{2bc - a^2}{2bc}$$

$$b^2 + c^2 - a^2 = 2bc - a^2$$

$$b^2 - 2bc + c^2 = (b - c)^2 = 0 \Rightarrow b = c$$

ត្រីកោណ ABC មានជ្រុង $b = c$ នាំឲ្យវាជាត្រីកោណសមបាត។

លំហាត់ទី៩៥

មានត្រីកោណ ABC មួយដែល $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ ។

តាង R និង S រៀងគ្នាជាកាំ និង ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC នេះ ។

ចូរស្រាយថា
$$\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c} = \frac{R(\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C)}{4S}$$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយថា
$$\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c} = \frac{R(\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C)}{4S}$$

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស និង ស៊ីនុសអនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ ABC

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad \text{ឬ} \quad \frac{\cos A}{a} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2abc}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \quad \text{ឬ} \quad \begin{cases} a = 2R \sin A \\ b = 2R \sin B \\ c = 2R \sin C \end{cases} \quad \text{និង} \quad S = \frac{abc}{4R}$$

គេបាន
$$\frac{\cos A}{a} = \frac{4R^2(\sin^2 B + \sin^2 C - \sin^2 A)}{8RS}$$

ឬ
$$\frac{\cos A}{a} = \frac{R(\sin^2 B + \sin^2 C - \sin^2 A)}{4S} \quad (1)$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ដូចគ្នាដែរ $\frac{\cos B}{b} = \frac{R(\sin^2 A + \sin^2 C - \sin^2 B)}{4S}$ (2)

និង $\frac{\cos C}{c} = \frac{R(\sin^2 A + \sin^2 B - \sin^2 C)}{4S}$ (3)

បូកសមភាព (1),(2) &(3) គេបាន ៖

$$\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c} = \frac{R(\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C)}{4S} \quad \text{ពិត ។}$$

លំហាត់ទី៩៦

ក្នុងគ្រប់ត្រីកោណ ABC ចូរស្រាយថា ៖

$$\text{ក/ } (1 + \cos A)(1 + \cos B)(1 + \cos C) = \frac{(\sin A + \sin B + \sin C)^2}{2}$$

$$\text{ខ/ } \left(1 + \frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3}\right)^3 \geq \left(\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{\sqrt{2}}\right)^2$$

ដំណោះស្រាយ

ក/ ស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$(1 + \cos A)(1 + \cos B)(1 + \cos C) = \frac{(\sin A + \sin B + \sin C)^2}{2}$$

តាងជ្រុង $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ និង $p = \frac{a+b+c}{2}$ ជាកន្លះបរិមាត្រ

យក R ជាកាំរង្វង់ចារឹកក្រៅ និង S ជាផ្ទៃក្រឡារបស់ ΔABC ។

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុសគេមាន $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

គេបាន $a^2 = (b^2 + 2bc + c^2) - 2bc(1 + \cos A)$

គេទាញ $1 + \cos A = \frac{(b+c)^2 - a^2}{2bc} = \frac{(b+c+a)(b+c-a)}{2bc}$

ដោយ $p = \frac{a+b+c}{2}$ នោះ $a+b+c = 2p$ និង $b+c-a = 2(p-a)$

គេបាន $1 + \cos A = \frac{4p(p-a)}{2bc} = \frac{2p(p-a)}{bc}$

ដូចគ្នាដែរ $1 + \cos B = \frac{2p(p-b)}{ac}$, $1 + \cos C = \frac{2p(p-c)}{ab}$

គេបាន

$$(1 + \cos A)(1 + \cos B)(1 + \cos C) = \frac{8p^2 \cdot p(p-a)(p-b)(p-c)}{(abc)^2} \quad (1)$$

តាមរូបមន្តហេរ៉ុង $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \frac{abc}{4R}$

គេទាញ $\frac{p(p-a)(p-b)(p-c)}{(abc)^2} = \frac{1}{16R^2} \quad (2)$

យកទំនាក់ទំនង (2) ជំនួសក្នុង (1) គេបាន ៖

$$(1 + \cos A)(1 + \cos B)(1 + \cos C) = \frac{8p^2}{16R^2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{p}{R}\right)^2 \quad (3)$$

តាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

គេទាញ $\sin A + \sin B + \sin C = \frac{a+b+c}{2R} = \frac{2p}{2R} = \frac{p}{R} \quad (4)$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

តាម (3) និង (4) គេបានទំនាក់ទំនង ៖

$$(1 + \cos A)(1 + \cos B)(1 + \cos C) = \frac{(\sin A + \sin B + \sin C)^2}{2} \quad \text{ពិត ។}$$

ខ/ ស្រាយបញ្ជាក់ថា ៖

$$\left(1 + \frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3}\right)^3 \geq \left(\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{\sqrt{2}}\right)^2$$

ដោយប្រើវិសមភាពមធ្យមនព្វន្ឋ មធ្យមធរណីមាត្រគេបាន ៖

$$(1 + \cos A)(1 + \cos B)(1 + \cos C) \leq \left(\frac{1 + \cos A + 1 + \cos B + 1 + \cos C}{3}\right)^3$$

$$\text{ឬ } (1 + \cos A)(1 + \cos B)(1 + \cos C) \leq \left(1 + \frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3}\right)^3$$

$$\text{ដោយ } (1 + \cos A)(1 + \cos B)(1 + \cos C) = \frac{(\sin A + \sin B + \sin C)^2}{2}$$

$$\text{ដូចនេះ } \left(1 + \frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3}\right)^3 \geq \left(\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{\sqrt{2}}\right)^2 \quad \text{ពិត ។}$$

លំហាត់ទី៩៧

គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយ ។

ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $1 - \cos A \leq \frac{a^2}{2bc}$

ដែល a, b, c ជាជ្រុងត្រីកោណ ABC ។

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $(1 - \cos A)(1 - \cos B)(1 - \cos C) \leq \frac{1}{8}$

ដំណោះស្រាយ

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $1 - \cos A \leq \frac{a^2}{2bc}$

តាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុសគេមាន $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

តាមវិសមភាពមធ្យមនព្វន្ឋ មធ្យមធរណីមាត្រគេមាន $b^2 + c^2 \geq 2bc$

គេទាញ $a^2 \geq 2bc - 2bc \cos A = 2bc(1 - \cos A)$

ដូចនេះ $1 - \cos A \leq \frac{a^2}{2bc}$ ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $(1 - \cos A)(1 - \cos B)(1 - \cos C) \leq \frac{1}{8}$

តាមសម្រាយខាងលើគេមាន $1 - \cos A \leq \frac{a^2}{2bc}$ (1)

ស្រាយដូចគ្នាដែរ $1 - \cos B \leq \frac{b^2}{2ac}$ (2) និង $1 - \cos C \leq \frac{c^2}{2ab}$ (3)

គុណវិសមភាព (1), (2), (3) អង្គ និង អង្គគេទទួលបាន ៖

$(1 - \cos A)(1 - \cos B)(1 - \cos C) \leq \frac{1}{8}$ ពិត ។

លំហាត់ទី៩៨

គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយ ។

ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C - 2\sin B \sin C \cos A$

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា ៖

$$\cot A + \cot B + \cot C = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C}{2\sin A \sin B \sin C}$$

ដំណោះស្រាយ

ក.ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C - 2\sin B \sin C \cos A$

តាង a, b, c ជាជ្រុងត្រីកោណ ABC និង R ជាកាំរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ។

តាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

គេទាញ
$$\begin{cases} a = 2R \sin A \\ b = 2R \sin B \\ c = 2R \sin C \end{cases} \quad (1)$$

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ (2)

យក (1) ជំនួសក្នុង (2) គេបាន ៖

$$4R^2 \sin^2 A = 4R^2 (\sin^2 B + \sin^2 C - 2 \sin B \sin C \cos A)$$

សម្រួល $4R^2$ ក្នុងអង្គទាំងពីរនៃសមភាពគេបាន ៖

$$\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C - 2 \sin B \sin C \cos A \quad \text{ពិត}$$

$$\text{ដូច្នេះ} \sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C - 2 \sin B \sin C \cos A \quad \sphericalcap$$

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា ៖

$$\cot A + \cot B + \cot C = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C}{2 \sin A \sin B \sin C}$$

តាមសម្រាយខាងលើគេមាន

$$\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C - 2 \sin B \sin C \cos A$$

$$\text{គេទាញ} \quad \cos A = \frac{\sin^2 B + \sin^2 C - \sin^2 A}{2 \sin B \sin C} \quad \text{ដោយ} \quad \cot A = \frac{\cos A}{\sin A}$$

$$\text{គេបាន} \quad \cot A = \frac{\sin^2 B + \sin^2 C - \sin^2 A}{2 \sin A \sin B \sin C} \quad \text{(i)}$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

ស្រាយដូចគ្នាដែរគេទទួលបាន $\cot B = \frac{\sin^2 A + \sin^2 C - \sin^2 B}{2\sin A \sin B \sin C}$ (ii)

និង $\cot C = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B - \sin^2 C}{2\sin A \sin B \sin C}$ (iii)

ធ្វើផលបូកសមភាព (i) , (ii) & (iii) គេបាន ៖

$$\cot A + \cot B + \cot C = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C}{2\sin A \sin B \sin C} \quad \text{ពិត}$$

ដូច្នេះ $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C}{2\sin A \sin B \sin C}$ ។

លំហាត់ទី៩៩

គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយមានមុំ A, B, C ជាមុំស្រួចដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព

$$\cot A + \cot B + \cot C = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\sin C} \right) \quad \text{។}$$

ចូរស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណសមង្ស ?

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណសមង្ស

តាង a, b, c ជាជ្រុង និង S ជាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC

$$\text{គេមាន } S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C$$

$$\text{គេទាញបាន } \sin A = \frac{2S}{bc}, \sin B = \frac{2S}{ac}, \sin C = \frac{2S}{ab}$$

$$\text{គេបាន } \cot A = \frac{\cos A}{\sin A} = \frac{\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}}{\frac{2S}{bc}} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4S}$$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រុងសរីស

ហើយ $\cot B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{4S}$, $\cot C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4S}$

គេបាន $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}$ (1)

ម៉្យាងទៀត $\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\sin C} = \frac{bc + ca + ab}{2S}$ (2)

តាមសម្មតិកម្ម $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\sin C} \right)$ (3)

យកសមីការ (1) & (2) ជំនួសក្នុង (3) គេបាន ៖

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S} = \frac{ab + bc + ca}{4S}$$

ឬ $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$

ទំនាក់ទំនងនេះសមមូល $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 = 0$

គេទាញ $\begin{cases} a - b = 0 \\ b - c = 0 \\ c - a = 0 \end{cases}$ នាំឱ្យ $a = b = c$ ។

ដោយត្រីកោណ ABC មានជ្រុងបីស្មើគ្នាវាជាត្រីកោណសមង្វ័យ ។

សម្គាល់ ៖

ដោយគេអាចស្រាយថា $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C}{2\sin A \sin B \sin C}$

ហើយសម្មតិកម្ម $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\sin C} \right)$

គេទាញបានសមីការ ៖

$$\frac{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C}{2\sin A \sin B \sin C} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\sin C} \right)$$

$$\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = \sin A \sin B + \sin B \sin C + \sin C \sin A$$

$$(\sin A - \sin B)^2 + (\sin B - \sin C)^2 + (\sin C - \sin A)^2 = 0$$

គេទាញ $\begin{cases} \sin A - \sin B = 0 \\ \sin B - \sin C = 0 \\ \sin C - \sin A = 0 \end{cases}$ នាំឱ្យ $\sin A = \sin B = \sin C$

ឬ $A = B = C$ នោះ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

លំហាត់ទី១០០


តាង R ជាកាំរង្វង់ចារឹកក្នុង និង S ជាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC មួយ

ក. ចូរស្រាយថា $(\cot A + \cot B)(\cot B + \cot C)(\cot C + \cot A) = \frac{2R^2}{S}$

ខ. បើ ABC ជាមុំស្រួចនោះចូរទាញឱ្យបានថា $\cos A \cos B \cos C \leq \frac{1}{8}$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយថា $(\cot A + \cot B)(\cot B + \cot C)(\cot C + \cot A) = \frac{2R^2}{S}$



គូសកំពស់ $AA' = h_a$ នៃ ΔABC ។

តាង $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ ។

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រុងសរសៃ

ក្នុងត្រីកោណកែង $ABA' & AA'C$ គេមាន

$$\cot B = \frac{BA'}{AA'} ; \cot C = \frac{A'C}{AA'}$$

$$\text{គេបាន } \cot B + \cot C = \frac{BA' + A'C}{AA'} = \frac{a}{h_a} = \frac{a^2}{2S}$$

ដែល S ជាផ្ទៃក្រឡា $\triangle ABC$ ។

$$\text{ដូចគ្នាដែរ } \cot C + \cot A = \frac{b^2}{2S}, \cot A + \cot B = \frac{c^2}{2S}$$

$$\text{គេបាន } (\cot A + \cot B)(\cot B + \cot C)(\cot C + \cot A) = \frac{a^2 b^2 c^2}{8S^3}$$

$$\text{ដោយ } S = \frac{abc}{4R} \text{ នោះ } abc = 4RS$$

$$\text{គេបាន } (\cot A + \cot B)(\cot B + \cot C)(\cot C + \cot A) = \frac{16R^2 S^2}{8S^3}$$

$$\text{ដូចនេះ } (\cot A + \cot B)(\cot B + \cot C)(\cot C + \cot A) = \frac{2R^2}{S} \quad \text{។}$$

ខ. ទាញ ឱ្យបានថា ៖ $\cos A \cos B \cos C \leq \frac{1}{8}$

មាន $(\cot A + \cot B)(\cot B + \cot C)(\cot C + \cot A) = \frac{2R^2}{S}$ (i)

បើ ABC ជាមុំស្រួចនោះ $\cot A > 0$, $\cot B > 0$, $\cot C > 0$

តាមវិសមភាព មធ្យមនព្វន្ត មធ្យមធរណីមាត្រគេមាន ៖

$$\cot A + \cot B \geq 2\sqrt{\cot A \cot B} \quad , \quad \cot B + \cot C \geq 2\sqrt{\cot B \cot C}$$

$$\cot C + \cot A \geq 2\sqrt{\cot C \cot A}$$

គុណវិសមភាពខាងលើនេះ អង្ក និង អង្ក គេបាន

$$(\cot A + \cot B)(\cot B + \cot C)(\cot C + \cot A) \geq 8 \cot A \cot B \cot C \quad \text{(ii)}$$

តាម (i) & (ii) គេទាញបាន $8 \cot A \cot B \cot C \leq \frac{2R^2}{S}$

តែ $S = \frac{abc}{4R} = \frac{8R^3 \sin A \sin B \sin C}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$

គេបាន $8 \cot A \cot B \cot C \leq \frac{2R^2}{2R^2 \sin A \sin B \sin C}$

ដូចនេះ $\cos A \cos B \cos C \leq \frac{1}{8}$ ។

លំហាត់ទី១០១

ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ គេឱ្យ $S_n = c \cos \frac{n\pi}{12} + s \sin \frac{n\pi}{12}$

ក. គណនាតម្លៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\sin \frac{\pi}{12}$

ខ. បង្ហាញថា $4S_{n+2} - 2\sqrt{6}S_{n+1} + S_n = 0$

ដំណោះស្រាយ

ក. គណនាតម្លៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\sin \frac{\pi}{12}$

ដោយគេមាន $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ នោះគេបាន ៖

$$\begin{aligned} c \cos \frac{\pi}{12} &= c \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= c \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + s \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{12} &= \sin \frac{\pi}{3} \left(-\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $c_1 = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$; $c_2 = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$ ។

ខ. បង្ហាញថា $4S_{n+2} - 2\sqrt{6}S_{n+1} + S_n = 0$

គេមាន $S_n = c_1^n + c_2^n$

តាំង $x_1 = c_1$; $x_2 = c_2$ នោះ $S_n = x_1^n + x_2^n$

គេមាន $x_1 + x_2 = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} = \sqrt{6}$

ហើយ $x_1 \cdot x_2 = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} = \frac{6 - 2}{4} = \frac{1}{1}$

គេបាន x_1 និង x_2 ជាឫសសមីការ $x^2 - \sqrt{6}x + \frac{1}{4} = 0$

ឬ $4x^2 - 2\sqrt{6}x + 1 = 0$

គេទាញ $\begin{cases} 4x_1^2 - 2\sqrt{6}x_1 + 1 = 0 \\ 4x_2^2 - 2\sqrt{6}x_2 + 1 = 0 \end{cases}$

ឬ $\begin{cases} 4x_1^{n+2} - 2\sqrt{6}x_1^{n+1} + x_1^n = 0 \quad (i) \\ 4x_2^{n+2} - 2\sqrt{6}x_2^{n+1} + x_2^n = 0 \quad (ii) \end{cases}$

បូកសមីការ (i) និង (ii) អង្គនឹងអង្គគេបាន ៖

$$4(x_1^{n+2} + x_2^{n+2}) - 2\sqrt{6}(x_1^{n+1} + x_2^{n+1}) + (x_1^n + x_2^n) = 0$$

ដូច្នេះ $4S_{n+2} - 2\sqrt{6}S_{n+1} + S_n = 0$ ។

លំហាត់ទី១០២

គេឱ្យត្រីកោណ ABC ហើយគេតាង r និង R រៀងគ្នាជាកាំរង្វង់
ចារឹកក្នុង និង កាំរង្វង់ចារឹកក្រៅនៃត្រីកោណ ។

ចូរស្រាយថា $c \cos A + c \cos B + c \cos C = 1 + \frac{r}{R}$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយថា $c \cos A + c \cos B + c \cos C = 1 + \frac{r}{R}$

គេមាន $c \cos A + c \cos B = 2c \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$
 $= 2c \cos \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2}$
 $= 2s \sin \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2}$

ហើយ $c \cos C = 1 - 2s \sin \frac{C}{2}$

$c \cos A + c \cos B + c \cos C = 1 + 2s \sin \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} - 2s \sin \frac{C}{2}$

ដោយ $s = \frac{C}{2} - ic = \frac{A-B}{2} - c = \frac{A+B}{2} - c = \frac{A-B}{2}$

$$= -2s = i \frac{A}{2} - i \frac{B}{2}$$

គេបាន $c = A + c = B + c = \frac{A}{2} + s = \frac{B}{2} + s = \frac{C}{2}$ (ii)

គេដឹងថា ៖

$$s = i \frac{A}{2} \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}} ; s = i \frac{B}{2} \sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}}$$

និង $s = i \frac{C}{2} \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}}$

$c = A + c = B + c = \frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{a} = \frac{(p-b)(p-c)}{b}$

តាមរូបមន្តហេរុង ៖

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = p = \frac{a}{4R}$$

គេទាញ $(p-a)(p-b)(p-c) = \frac{S^2}{p} = p^2 = rS$

ហើយ $a^2 + b^2 + c^2 = 4p^2 + r^2$

១០៤ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើស

គេបាន $c \quad A+c \quad B+c \quad C=1+4 \cdot \frac{rS}{4p} = 1 + \frac{r}{R}$

ដូចនេះ $c \quad A+c \quad B+c \quad C=1+\frac{r}{R} \quad \text{។}$

លំហាត់ទី១០៣

គេយក A, B, C ជាមុំបីនៃត្រីកោណ ABC ។

តាងអនុគមន៍ $y = \cot A + \frac{2\sin A}{\cos A + \cos(B - C)}$

រកតម្លៃអប្បរមានៃអនុគមន៍នេះ ?

ដំណោះស្រាយ

តម្លៃអប្បរមានៃអនុគមន៍

$$y = \cot A + \frac{2\sin A}{\cos A + \cos(B - C)}$$

គេមាន $A + B + C = \pi$

នៃ៖ $\cos A = \cos(\pi - B - C) = -\cos(B + C)$

គេបាន

$$\begin{aligned}
 y &= \cot A + \frac{2 \sin A}{\cos(B - C) - \cos(B + C)} \\
 &= \cot A + \frac{\sin A}{\sin B \sin C} \\
 &= \frac{\cos A \sin B \sin C + \sin^2 A}{\sin A \sin B \sin C}
 \end{aligned}$$

យក a, b, c ជាជ្រុងរបស់ត្រីកោណនេះ

តាមទ្រឹស្តីបទស៊ីនុសគេមាន

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \quad \text{នាំឱ្យ} \quad \begin{cases} a = 2R \sin A \\ b = 2R \sin B \\ c = 2R \sin C \end{cases} \quad (1)$$

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុសគេមាន

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (2)$$

យកទំនាក់ទំនង (1) ជួសក្នុង (2) គេបាន

$$4R^2 \sin^2 A = 4R^2 (\sin^2 B + \sin^2 C - 2 \sin B \sin C \cos A)$$

$$\text{តើ ទាញ } \sin B \sin C \cos A = \frac{\sin^2 B + \sin^2 C - \sin^2 A}{2}$$

ហេតុនេះអនុគមន៍ y អាចសរសេរ

$$y = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C}{2 \sin A \sin B \sin C}$$

តាមវិសមភាព AM – GM គេមាន

$$\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C \geq 3 \sqrt[3]{(\sin A \sin B \sin C)^2}$$

$$\Rightarrow y \geq \frac{3 \sqrt[3]{(\sin A \sin B \sin C)^2}}{2 \sin A \sin B \sin C}$$

$$\Rightarrow y \geq \frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{1}{\sin A \sin B \sin C}}$$

តាងអនុគមន៍ $f(x) = \sin x$ ដែល $0 < x < \pi$

គេមាន $f''(x) = -\sin x < 0, \forall x \in (0; \pi)$

នាំឲ្យ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ប៉ោង ។

តាមទ្រឹស្តីបទ Jensen គេបាន

$$\frac{f(A) + f(B) + f(C)}{3} \leq f\left(\frac{A + B + C}{3}\right)$$

$$\text{ឬ } \frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \sin\left(\frac{A + B + C}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

តាម វិសមភាព AM – GM គឺមាន

$$\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \geq \sqrt[3]{\sin A \sin B \sin C}$$

$$\text{គេទាញ } \sqrt[3]{\sin A \sin B \sin C} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{ឬ } \sin A \sin B \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

$$\text{ហេតុនេះ } y \geq \frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{1}{\sin A \sin B \sin C}} \geq \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

$$\text{ដោយ } y = \cot A + \frac{2 \sin A}{\cos A + \cos(B - C)} \geq \sqrt{3}$$

ដូចនេះតម្លៃអប្បបរមានៃអនុគមន៍គឺ $\sqrt{3}$ ។

លំហាត់ទី១០៤

គេឲ្យ ABC ជាត្រីកោណមួយហើយតាង r និង R

រៀងគ្នាជាកាំរង្វង់ចារឹកក្នុង និងកាំរង្វង់ចារឹកក្រៅ ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា ៖

$$\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} + \sin \frac{C}{2} \sin \frac{A}{2} \leq \frac{5}{8} + \frac{r}{4R}$$

ដំណោះស្រាយ

ស្រាយបញ្ជាក់ថា ៖

$$\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} + \sin \frac{C}{2} \sin \frac{A}{2} \leq \frac{5}{8} + \frac{r}{4R}$$

តាង a, b, c ជាជ្រុងរបស់ត្រីកោណ ABC ហើយយក

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\text{គេមាន } \sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}} ; \sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}}$$

$$\sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}}$$

$$\begin{aligned}
 \text{យើងបាន } \cos A + \cos B + \cos C &= 1 + 4\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \\
 &= 1 + 4 \frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{abc} \\
 &= 1 + 4 \frac{S^2}{4RS} = 1 + \frac{S}{pR} \\
 &= 1 + \frac{pr}{pR} = 1 + \frac{r}{R}
 \end{aligned}$$

$$\cos A + \cos B + \cos C = 1 + \frac{r}{R}$$

$$1 - 2\sin^2 \frac{A}{2} + 1 - 2\sin^2 \frac{B}{2} + 1 - 2\sin^2 \frac{C}{2} = 1 + \frac{r}{R}$$

$$3 - 2\left(\sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2}\right) = 1 + \frac{r}{R}$$

$$\sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2} = 1 - \frac{r}{2R} \quad (1)$$

តាមវិសមភាព Jensen យើងមាន ៖

$$\sin \frac{A}{2} + \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2} \leq 3\sin\left(\frac{A+B+C}{6}\right) = 3\sin \frac{\pi}{6}$$

$$\sin \frac{A}{2} + \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2} \leq \frac{3}{2}$$

លើកអង្គទាំងពីរជាការេគេបាន ៖

$$\left(\sin \frac{A}{2} + \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2} \right)^2 \leq \frac{9}{4} \quad (2)$$

ដោយប្រើសមភាព

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$$

តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) គេទាញបាន ៖

$$1 - \frac{r}{2R} + 2\left(\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} + \sin \frac{C}{2} \sin \frac{A}{2}\right) \leq \frac{9}{4}$$

$$\text{ឬ} \quad 2\left(\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} + \sin \frac{C}{2} \sin \frac{A}{2}\right) \leq \frac{5}{4} + \frac{r}{2R}$$

$$\text{ដូច្នេះ} \quad \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} + \sin \frac{C}{2} \sin \frac{A}{2} \leq \frac{5}{8} + \frac{r}{4R} \quad \text{។}$$